

24 cm

13 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzimidazoles
- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión provocar el vómito al paciente, suministrándole un vaso de agua tibia.
- No provocar vómitos, ni dar de beber líquidos a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación, alejar al paciente del área contaminada y colocarlo en un lugar fresco, seco y ventilado en posición de reposo y solicitar inmediatamente auxilio médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Solicite atención médica inmediata.
- **En caso de Emergencias llamar a: CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD Telf.: 423-7600**
- **NOTA AL MÉDICO:** No existe un tratamiento establecido, por eso es recomendable un tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- **PELIGROSO para organismos acuáticos.**
- No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los sobrantes o desechos y envases vacíos del producto.
- **Respetar una banda de protección para cuerpos de agua de al menos 5 metros. (Zona de no aplicación)**
- Peligroso para animales domésticos, la fauna y flora silvestre; no permita animales en el área tratada.
- No aplicar el producto directamente al suelo ni en zonas con napa freática superficial.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

COD. 560626

FUKARIM®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Ingrediente activo: Carbendazim..... 500 g/L
- Aditivos.....c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 083 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar N° 991 piso 9
Magdalena del Mar Lima - Perú.
Teléfono: 501-1000
Fax: 262-8403



FABRICADO Y FORMULADO POR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road
Shandong, China

Número de Lote
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :
:

CONTENIDO NETO: 500 ml

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUKARIM, es un fungicida sistémico de efecto preventivo y curativo, se absorbe por las raíces y tejidos verdes de la planta y se trasloca en sentido acropétalo. Controla un amplio rango de enfermedades fúngicas que dañan frutales y hortalizas. **FUKARIM**, se puede aplicar con pulverizadores terrestres de tal manera que brinde una cobertura total al cultivo a tratar.

Para la preparación de **FUKARIM**, haga una premezcla en poca agua, agite bien y una vez que se disuelva el producto vierta la premezcla en el tanque de agua, cilindro o mochila según el caso y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agite de nuevo constantemente y proceda a aplicar

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS Y DOSIS

CULTIVOS	ENFERMEDADES		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/ 200 L		
FRESA	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5 - 0.7	250-350	2	5
PALTO	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	200-300	28	0.1
	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2 - 3	-	28	0.1
PAPRIKA	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	300	3	0.1
ESPARRAGO	Cercospora	<i>Cercospora asparagi</i>	0.6 - 0.7	-	ND	0.1
ARROZ	Mancha carmelita	<i>Helminthosporium oryzae</i>	0.5 - 0.6	500 - 600*	21	0.01
ALCACHOFA	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	200 - 300	7	0.1
MELOCOTONERO	Oidium	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	-	200 - 250	15	0.2

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda un máximo de una aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: Cuando se aplica a campo abierto, se debe esperar un mínimo de 24 horas para el ingreso de personas. Cuando se aplica en invernadero, el tiempo de entrada al área tratada es de 6 horas.

COMPATIBILIDAD: **FUKARIM**, es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD: **FUKARIM**, no es fitotóxico si se usa en las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

AGITE ESTE ENVASE ANTES DE ABRIRLO Y UTILIZARLO

AGITE ESTE ENVASE ANTES DE ABRIRLO Y UTILIZARLO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

