"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzimidazoles
- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión provocar el vómito al paciente, suministrándole un vaso de agua tibia.
- No provocar vómitos, ni dar de beber líquidos a una persona inconsciente
- En caso de inhalación, alejar al paciente del área contaminada y colocarlo en un lugar fresco, seco y ventilado en posición de reposo y solicitar inmediatamente
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Solicite atención médica
- En caso de Emergencias Ilamar a: SAMU Telf.: 106. DROKASA PERÚ S.A Telf.: (01) 501-1000. NOTAAL MÉDICO: No existe un tratamiento establecido, por eso es recomendable un tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe reutilizarse. Después de us el contenido, enjuaque tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el luga destinado por las autoridades locales para éste fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente en

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENT

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, es anques o arroyos y drenajes con los sobrantes o desechos y envases vacíos del producto.
- Respetar una banda de protección para cuerpos de agua de al menos 5 metros. (Zona de no aplicación)
- Peligroso para animales domésticos, la fauna y flora silvestre; no permita animales en el área tratada
- en erarea tratada. No aplicar el producto directamente al suelo ni en zonas con napa freática superficie
- derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por locales para este fin.

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN

Carbendazim. 500 g/L Aditivos. .c.s.p.1 Liti

Reg. PQUA Nº 083-SENASA

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar Nº 991 piso 2 Magdalena del Mar Lima Per Teléfono: (01) 501-1000



FORMULADO POR

AGROMOL BIOTECH CO., LTD.

side, middle section of Binhe Road, Shanxian County Chemical Industry Park, Xieji Town, Shanxian County, Heze City, Shandong Province, China.

eléfono: +86 25 86304651

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 500 ml

Número de Lote Fecha de Formulación Fecha de Vencimiento

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUKARIM, es un fungicida sistemico de efecto preventivo y cura por las raices y tejidos verdes de la planta y se tras loca en solito acropétalo. Controla un amplio rango de enfermedades ungosas que dañan frutales y hortalizas. FUKARIM, se puede aplicar con puverizadores terrestres de tal manera que brinde una cobertura to al al cultivo a tratar.

Para la preparación de **FUKARIM**, haga una premezcla en poca agua, agite bien y una vez que se disuelva el producto vierta la premezcla en el tanque de agua, cilindro o mochila según el caso y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agite de nuevo constantemente y proceda a aplicar

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	ENFERMEDADES		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/ 200 L	días	ppm
Fresa	Moho gris	Botrytis cinerea	0.5 - 0.7	250-350	2	5
Palto	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	200-300	28	0.1
	Muerte regresiva	Lasiodiplodia theobromae	2 - 3	-	28	0.1
Páprika	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	300	3	0.1
Espárrago	Cercospora	Cercospora asparagi	0.6 - 0.7	-	ND	0.1
Arroz	Mancha carmelita	Helminthosporium oryzae	0.5 - 0.6	500 - 600*	21	0.01
Alcachofa	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	200 - 300	7	0.1
Melocotonero	Oidium	Sphaeroteca pannosa	-	200 - 250	15	0.2

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda un máximo de una aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: Cuando se aplica a campo abierto, se debe esperar un mínimo de 24 horas para el ingreso de personas.

Cuando se aplica en invernadero, el tiempo de entrada al área tratada es de 6 horas. COMPATIBILIDAD: FUKARIM, es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto".









LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO















