

30.0 cm

2.0 cm

“ LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No fumar, comer ni beber durante la manipulación y uso de este producto.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua o bebidas.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar en un lugar seco, con buena ventilación y en la sombra.
- Aplicar siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico Neonicotinoides
- En caso de intoxicación, inmediatamente llamar a un médico, mientras tanto alejar al afectado de la zona de peligro.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua manteniendo los párpados bien abiertos, durante 15-20 minutos. Si el contacto fuese directo con la piel, retirar la ropa y lave con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
- En caso de ingestión llame inmediatamente a un médico, suministre un vaso de agua al paciente, NO inducir al vómito.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la copia de esta etiqueta.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

SAMU: 106
AVGUST PERU SAC: 016522182

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en sitios destinados por las autoridades.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismo acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- El aplicador debe emplear las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de 5 m hacia fuentes de agua.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



Diprid® 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Imidacloprid 350 gr/ L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 930- SENASA

Titular de Registro:
AVGUST PERU SAC
Cal. Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate.
Formulado por:
Kinyield Industry Co. Limited
Unit 905, Workingberg Commercial Building 41-47, Marble Road, Hong Kong - China.

Importador y Distribuidor:

avgust crop protection

Contenido Neto: 1 L.
N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Tóxico en caso de ingestión
Tóxico en contacto con la piel
Tóxico si se Inhala



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DIPRID 350 SC es un insecticida sistémico, transtaminar para ser aplicado en el control de la *Prodiplosis longifila* la "Mosquilla de los brotes". Actúa por ingestión y contacto.

Preparación Mezcla: Vierta la cantidad de **DIPRID 350 SC** en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad, luego complete el volumen de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea.

“CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/cil 200L	L/Ha		
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.150-0.200	-	3	0.5
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.200	-	3	0.1
Palto	Queresa	<i>Fiorinia florinae</i>	0.150	-	7	1.0
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	-	1.50	14	1.0
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0.14	-	21	1.0

P.C: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado como máximo hasta 3 veces por campaña. Aplicar a los primeros ataques de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar antes de 24 horas al campo tratado.

COMPATIBILIDAD

DIPRID 350 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Es incompatible con productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

MODERADAMENTE PELIGROSO-3



15.0 cm