

Dale® 90 SP

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Methomyl 900 g/kg
Aditivo..... 100 g/kg

Reg.PQUA N° 116-SENASA

“VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

TITULAR DE REGISTRO:

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto MzA-6 Lote 15 - La Molina. Lima, Perú
Teléfono: 348-1018 / 346-9609

Formulador:

Point Agro-China Ltd

Wan Shi, Yixing,
Jiangsu, 214217 China
Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

Importado y Distribuido por:

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto MzA-6 Lote 15 - La Molina. Lima, Perú
Teléfono: 348-1018 / 346-9609

Contenido: 100 g
Lote:
Fecha de fabricación:
Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
- No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.
- Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón.

Cuando hay síntomas de intoxicación aplicar sulfato de atropina en forma intravenosa o intramuscular 1 - 2 mg en adultos, repetir si es necesario.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800-1-3040
POINT ANDINA S.A. 348-1018/349-9609
ESSALUD: 0801-10200 ó 107
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del envase inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.

Peligroso para invertebrados acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.

No aplicar el producto en suelos con napa freática superficial.

Respetar una banda de protección hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

INDICATIVOS DE USO

DALE 90 SP es un insecticida carbamato sistémico de amplio espectro de acción.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

**USO ESPECÍFICO DEL PRODUCTO
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVOS	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Científico	Común	Kg/ha	g/cil		
Tomate	<i>Spodoptera eridania</i>	Gusano del fruto	0.4	200	7	1
Maíz	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Cogollero	0.5 - 0.6	250-300	7	0.1
Espárrago	<i>Heliothis virescens</i>	Barrenador de brotes	0.4	200	5	2
Espárrago	<i>Spodoptera eridania</i>	Gusano cogollero	0.4	200	5	2
Espárrago	<i>Copitarsia turbata</i>	Copitarsia	0.4	200	5	2
Espárrago	<i>Thrips tabaci</i>	Trips	0.4	200	5	2
Pimiento	<i>Symmetrischema capsicum</i>	Gusano del fruto	0.4	200	3	1
Pimiento	<i>Heliothis virescens</i>	Barrenador de brotes	0.4	200	3	1
Pimiento	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Spodoptera	0.4	200	3	1
Cebolla	<i>Thrips tabaci</i>	Trips	0.4 - 0.6	200-300	10	0.2
Alcachofa	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Cogollero	0.4	200	N.d	0.2
Alcachofa	<i>Heliothis virescens</i>	Barrenador de brotes	0.4	200	N.d	0.2
Sandia	<i>Diaphania nitidalis</i>	Perforador de guía	0.4 - 0.6	200-300	3	0.2
Palto	<i>Fiorinia florinae</i>	Fiorinia	-	200	1	0.05
Palto	<i>Thrips tabaci</i>	Trips	-	200	1	2
Palto	<i>Dagbertus minensis</i>	Chinche del palto	-	200	1	2
Col	<i>Plutella xylostella</i>	Gusano de hoja	0.4 - 0.6	200-300	3	0.05
Alfalfa	<i>Prodenia eridania</i>	Gusano ejército	-	200	7	10
Naranja	<i>Lepidosaphes beckii</i>	Quereses coma	-	200-300	3	1

P.C. = Período de carencia. L.M.R. = Límite Máximo de Residuos.
N.d. = No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar en cualquier etapa del cultivo. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: DALE 90 SP es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre.

FITOTOXICIDAD: DALE 90 SP no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta, cuando se aplica a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

