

Dale[®]_{90 SP}

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

COMPOSICIÓN:

Methomyl 900 g/kg
Aditivo..... c.s.p. 1 kg

Reg.PQUA N° 116-SENASA

“VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”



Titular de registro:
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.
Av. Javier Prado Este N°6726 Int. 301-A
Urb. Santa Patricia II Etapa,
La Molina, Lima, Perú
Teléfono: (01) 499-7831

Formulador:
Point Agro-China Ltd
Wan Shi, Yixing,
Jiangsu, 214217 China

Importado y distribuido por:
MEXAGRO DEL PERÚ S.A.C.
Av. Las Camelias N° 877, Interior N° 302,
Urb. Santa Cruz, San Isidro,
Lima, Perú.
Teléfono: 925274051



Contenido: 100 g
Lote:
Fecha de fabricación:
Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
- No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.
- Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo químico: Carbamatos
En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón.
Cuando hay síntomas de intoxicación aplicar sulfato de atropina en forma intravenosa o intramuscular 1 - 2 mg en adultos, repetir si es necesario.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: (01) 328-7700
ESSALUD: (01) 411-8000 opción 4
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS: (01) 499-7831

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del envase inutilicelo, triturándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para invertebrados acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.
- No aplicar el producto en suelos con napa freática superficial.
- Respetar una banda de protección hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DALE 90 SP es un insecticida carbamato sistémico de amplio espectro de acción. Se aplica con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme. Para su preparación llenar con agua hasta la mitad del tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Ha	g/200L		
Tomate	"Gusano del fruto"	<i>Spodoptera eridania</i>	0.4	200	7	1
Maíz	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.5 - 0.6	250-300	7	0.1
Espárrago	"Barrenador de brotes"	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	5	2
Espárrago	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera eridania</i>	0.4	200	5	2
Espárrago	"Copitarsia"	<i>Copitarsia turbata</i>	0.4	200	5	2
Espárrago	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.4	200	5	2
Pimiento	"Gusano del fruto"	<i>Symmetrischema capsicum</i>	0.4	200	3	1
Pimiento	"Barrenador de brotes"	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	3	1
Pimiento	"Spodoptera"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.4	200	3	1
Cebolla	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.4 - 0.6	200-300	10	0.2
Alcachofa	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.4	200	N.d	0.2
Alcachofa	"Barrenador de brotes"	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	N.d	0.2
Sandia	"Perforador de guía"	<i>Diaphania nitidalis</i>	0.4 - 0.6	200-300	3	0.2
Palto	"Florinia"	<i>Fiorinia fioriniae</i>	-	200	1	0.05
Palto	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	-	200	1	2
Palto	"Chinche del palto"	<i>Dagbertus minensis</i>	-	200	1	2
Col	"Gusano de hoja"	<i>Plutella xylostella</i>	0.4 - 0.6	200-300	3	0.05
Alfalfa	"Gusano ejército"	<i>Spodoptera eridania</i>	-	200	7	10
Naranja	"Queresa coma"	<i>Lepidosaphes beckii</i>	-	200-300	3	1

P.C. = Período de carencia. L.M.R. = Límite Máximo de Residuos.
N.d. = No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar en cualquier etapa del cultivo. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre.

FITOTOXICIDAD: no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta, cuando se aplica a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular de Registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.



Logo de INAP

100% Pantone Warm Red C

100% Pantone 199 C

PANTONE: 129 C

PANTONE: 7480 C

PANTONE: 7479 C