

# Dale® 90 SP

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Methomyl ..... 900 g/kg  
Aditivo..... 100 g/kg

Reg.PQUA N° 116-SENASA

“VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

TITULAR DE REGISTRO:

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto MzA-6 Lote 15 - La Molina. Lima, Perú  
Teléfono: 348-1018 / 346-9609

Formulador:

Point Agro-China Ltd

Wan Shi, Yixing,  
Jiangsu, 214217 China  
Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

Importado y Distribuido por:

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto MzA-6 Lote 15 - La Molina. Lima, Perú  
Teléfono: 348-1018 / 346-9609

Contenido: 500 g  
Lote:  
Fecha de fabricación:  
Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

ALTAMENTE PELIGROSO  
TÓXICO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
- No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.
- Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón.

Cuando hay síntomas de intoxicación aplicar sulfato de atropina en forma intravenosa o intramuscular 1 - 2 mg en adultos, repetir si es necesario.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800-1-3040  
POINT ANDINA S.A. 348-1018/349-9609  
ESSALUD: 0801-10200 ó 107  
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del envase inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.

Peligroso para invertebrados acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.

No aplicar el producto en suelos con napa freática superficial.

Respetar una banda de protección hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INDICATIVOS DE USO

DALE 90 SP es un insecticida carbamato sistémico de amplio espectro de acción.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

USO ESPECÍFICO DEL PRODUCTO  
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVOS  | NOMBRE DE LA PLAGA      |                      | DOSIS     |         | P.C.<br>(Días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-------------------------|----------------------|-----------|---------|----------------|-----------------|
|           | Científico              | Común                | Kg/Ha     | g/cil   |                |                 |
| Tomate    | Spodoptera eridania     | Gusano del fruto     | 0.4       | 200     | 7              | 1               |
| Maíz      | Spodoptera frugiperda   | Cogollero            | 0.5 - 0.6 | 250-300 | 7              | 0.1             |
| Espárrago | Heliothis virescens     | Barrenador de brotes | 0.4       | 200     | 5              | 2               |
| Espárrago | Spodoptera eridania     | Gusano cogollero     | 0.4       | 200     | 5              | 2               |
| Espárrago | Copitarsia turbata      | Copitarsia           | 0.4       | 200     | 5              | 2               |
| Espárrago | Thrips tabaci           | Trips                | 0.4       | 200     | 5              | 2               |
| Pimiento  | Symmetrischema capsicum | Gusano del fruto     | 0.4       | 200     | 3              | 1               |
| Pimiento  | Heliothis virescens     | Barrenador de brotes | 0.4       | 200     | 3              | 1               |
| Pimiento  | Spodoptera frugiperda   | Spodoptera           | 0.4       | 200     | 3              | 1               |
| Cebolla   | Thrips tabaci           | Trips                | 0.4 - 0.6 | 200-300 | 10             | 0.2             |
| Alcachofa | Spodoptera frugiperda   | Cogollero            | 0.4       | 200     | N.d            | 0.2             |
| Alcachofa | Heliothis virescens     | Barrenador de brotes | 0.4       | 200     | N.d            | 0.2             |
| Sandia    | Diaphania nitidalis     | Perforador de guía   | 0.4 - 0.6 | 200-300 | 3              | 0.2             |
| Palto     | Fiorinia floriniae      | Fiorinia             | -         | 200     | 1              | 0.05            |
| Palto     | Thrips tabaci           | Trips                | -         | 200     | 1              | 2               |
| Palto     | Dagbertus minensis      | Chinche del palto    | -         | 200     | 1              | 2               |
| Col       | Plutella xylostella     | Gusano de hoja       | 0.4 - 0.6 | 200-300 | 3              | 0.05            |
| Alfalfa   | Prodenia eridania       | Gusano ejército      | -         | 200     | 7              | 10              |
| Naranja   | Lepidosaphes beckii     | Queresa coma         | -         | 200-300 | 3              | 1               |

P.C. = Período de carencia. L.M.R. = Límite Máximo de Residuos.

N.d. = No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar en cualquier etapa del cultivo. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: DALE 90 SP es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre.

FITOTOXICIDAD: DALE 90 SP no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta, cuando se aplica a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

