

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Debilidad, visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas, cólicos, molestias en el pecho, constricción de pupilas, sudor, pulso lento, temblores musculares. Si estos síntomas aparecen, proporcione primeros auxilios y acuda a un médico inmediatamente.

PRIMEROS AUXILIOS

•Grupo Químico: Carbamato

En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón.

Cuando hay síntomas de intoxicación aplicar sulfato de atropina en forma intravenosa o intramuscular 1 - 2 mg en adultos, repetir si es necesario.

En caso de emergencias llamar a:

CICOTOX: (01) 328-7700
ESSALUD: (01) 411-8000 opción 4
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS:
(01) 499-7831

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para invertebrados acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.
- No aplicar el producto en suelos con napa freática superficial.
- Respetar una banda de protección hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

No utilice este envase para guardar alimentos.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico : Sólido (polvo)
Color : Blanco
Olor : Ligeramente sulfuroso
pH : 6.0 - 8.0
Densidad : 0.59 - 0.69 g/ml
Producto inflamable: No inflamable
Tipo de envases: Bolsa de aluminio trilaminado.
Presentaciones: 100 g, 200 g, 500 g y 1 Kg.

Titular de registro:
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.

Av. Javier Prado Este N°6726 Int. 301-A
Urb. Santa Patricia II Etapa,
La Molina, Lima, Perú
Teléfono: (01) 499-7831



Formulado por:

Point Agro-China Ltd.

Wan Shi, Yixing, Jiangsu,
214217, China

Importado y distribuido por:
MEXAGRO DEL PERÚ S.A.C.

Av. Las Camelias N° 877
Interior N° 302, Urb. Santa Cruz
San Isidro, Lima, Perú.
Teléfono: 925274051



Dale[®]
90 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Reg. PQUA N° 116-SENASA

“VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Composición :

Methomyl 900 g/Kg
Aditivosc.s.p. 1 Kg

Grupo químico:

Carbamato


Nombre químico(IUPAC):

S-metil-N (methylcarbamoyloxy) thioacetimide

Fórmula empírica, peso molecular

C₅H₁₀N₂O₂S
PM=162.23

Fórmula estructural:



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE



ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO



LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

• Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.

• Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados

• No comer, no beber ni fumar durante y después de la operación sin haberse lavado con agua y jabón.

• Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinales de uso humano o veterinario.

•No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.

• Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.

•Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre.

•Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DALE 90 SP es un insecticida carbamato de amplio espectro de acción y tiene efecto inmediato. Posee acción sistemática ascendente y actividad translaminar cuando se aplica al follaje. Actúa por contacto e ingestión sobre adultos, ninfas y larvas de muchas especies de insectos, en especial lepidópteros, y también por contacto sobre los huevos de algunas especies.

Se aplica con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme. Para su preparación llenar con agua hasta la mitad del tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar en cualquier etapa del cultivo. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

NUMERO MÁXIMO DE APLICACIONES POR CAMPAÑA/AÑO:

2 aplicaciones campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:

No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

DALE 90 SP es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre.

FITOTOXICIDAD:

DALE 90 SP no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta, cuando se aplica a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Ha	g/200L		
Tomate	“Gusano del fruto”	<i>Spodoptera eridania</i>	0.4	200	7	1
Maíz	“Cogollero”	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.5 - 0.6	250-300	7	0.1
Espárrago	“Barrenador de brotes”	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	5	2
Espárrago	“Gusano cogollero”	<i>Spodoptera eridania</i>	0.4	200	5	2
Espárrago	“Copitarsia”	<i>Copitarsia turbata</i>	0.4	200	5	2
Espárrago	“Trips”	<i>Thrips tabaci</i>	0.4	200	5	2
Pimiento	“Gusano del fruto”	<i>Symmetrischema capsicum</i>	0.4	200	3	1
Pimiento	“Barrenador de brotes”	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	3	1
Pimiento	“Spodoptera”	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.4	200	3	1
Cebolla	“Trips”	<i>Thrips tabaci</i>	0.4 - 0.6	200-300	10	0.2
Alcachofa	“Cogollero”	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.4	200	N.d	0.2
Alcachofa	“Barrenador de brotes”	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	N.d	0.2
Sandía	“Perforador de guía”	<i>Diaphania nitidalis</i>	0.4 - 0.6	200-300	3	0.2
Palto	“Fiorinia”	<i>Fiorinia fioriniae</i>	-	200	1	0.05
Palto	“Trips”	<i>Thrips tabaci</i>	-	200	1	2
Palto	“Chinche del palto”	<i>Dagbertus minensis</i>	-	200	1	2
Col	“Gusano de hoja”	<i>Plutella xylostella</i>	0.4 - 0.6	200-300	3	0.05
Alfalfa	“Gusano ejército”	<i>Spodoptera eridania</i>	-	200	7	10
Naranja	“Queresa coma”	<i>Lepidosaphes beckii</i>	-	200-300	3	1

LMR= Límite máximo de Residualidad, en partes por millón (ppm).

PC= Periodo de carencia.

N.D.= No determinado.



100% Pantone Warm Red C



100% Pantone 199 C

Logo de INAP

PANTONE: 129 C

PANTONE: 7480 C

PANTONE: 7479 C