

1 cm para sellar

Dale[®] 90 SP

INSECTICIDA AGRÍCOLA


POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingrediente activo: Methomyl 900 g/kg
Ingredientes inertes: 100 g/kg

Reg.PQUA N° 116-SENASA

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"



TITULAR DE REGISTRO:

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto MZA-6 Lote 15 - La Molina. Lima, Perú
Teléfono: 348-1018 / 346-9609

Fabricante:

Point Agro-China Ltd

Wan Shi, Yixing,
Jiangsu, 214217 China
Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

Importado y Distribuido por:

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto MZA-6 Lote 15 - La Molina. Lima, Perú
Teléfono: 348-1018 / 346-9609

Contenido: 50 Kg

Lote:

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

1 cm para sellar

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
- No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.
- Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón.
Cuando hay síntomas de intoxicación aplicar sulfato de atropina en forma intravenosa o intramuscular 1 - 2 mg en adultos, repetir si es necesario.
Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800-1-3040
POINT ANDINA S.A. 348-1018/349-9609
ESSALUD: 0801-10200 ó 107
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del envase inutilicelo, triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
Peligroso para invertebrados acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.
No aplicar el producto en suelos con napa freática superficial.
Respetar una banda de protección hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INDICATIVOS DE USO

DALE 90 SP es un insecticida carbamato sistémico de amplio espectro de acción.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

USO ESPECIFICO DEL PRODUCTO

CULTIVOS	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Técnico	Común	Kg/Ha	g/cil		
Tomate	<i>Spodoptera eridania</i>	Gusano del fruto	0.4	200	7	1
Maíz	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Cogollero	0.5 - 0.6	250-300	7	0.1
Espárrago	<i>Heliothis virescens</i>	Barrenador de brotes	0.4	200	1	2
Espárrago	<i>Spodoptera eridania</i>	Gusano cogollero	0.4	200	1	2
Espárrago	<i>Copitarsia turbata</i>	Copitarsia	0.4	200	1	2
Espárrago	<i>Thrips tabaci</i>	Trips	0.4	200	1	2
Pimiento	<i>Symmetrischema casicum</i>	Gusano del fruto	0.4	200	3	1
Pimiento	<i>Heliothis virescens</i>	Barrenador de brotes	0.4	200	3	1
Pimiento	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Spodoptera	0.4	200	3	1
Cebolla	<i>Thrips tabaci</i>	Trips	0.4 - 0.6	200-300	7	0.2
Alicachota	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Cogollero	0.4	200	N.d	0.2
Alicachota	<i>Heliothis virescens</i>	Barrenador de brotes	0.4	200	N.d	0.2
Sandía	<i>Diaphania nitidalis</i>	Perforador de guía	0.4 - 0.6	200-300	3	0.2
Palto	<i>Fiorinia fioriniae</i>	Fiorinia	-	200	1	0.05
Palto	<i>Thrips tabaci</i>	Trips	-	200	1	2
Palto	<i>Dagbertus minensis</i>	Chinche del palto	-	200	1	2
Col	<i>Plutella xylostella</i>	Gusano de hoja	0.4 - 0.6	200-300	3	0.05
Alfalfa	<i>Prodenia eridania</i>	Gusano ejército	-	200	7	10
Naranja	<i>Lepidosaphes beckii</i>	Queresa coma	-	200-300	3	1

P.C. = Periodo de carencia. L.M.R. = Límite Máximo de Residuos.
N.d. = No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar en cualquier etapa del cultivo. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **DALE 90 SP** es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre.

FITOTOXICIDAD: **DALE 90 SP** no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

