

1 cm para sellar

# Dale<sup>®</sup> 90 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
POLVO SOLUBLE - SP

**COMPOSICIÓN:**

Ingrediente activo: Methomyl ..... 900 g/kg  
Ingredientes inertes: ..... c.s.p. 1 kg

Reg.PQUA N° 116-SENASA

“VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”



Titular de registro, Importador y Distribuidor:  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.**  
Calle Jorge Vanderghen 315 - Miraflores. Lima, Perú  
Teléfono: 422-5900

Fabricante:  
**Point Agro-China Ltd**  
Wan Shi, Yixing,  
Jiangsu, 214217 China  
Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

Contenido: 50 Kg  
Lote:  
Fecha de fabricación:  
Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**ALTAMENTE PELIGROSO  
TÓXICO**

1 cm para sellar

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS  
NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
- No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.
- Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón. Cuando hay síntomas de intoxicación aplicar sulfato de atropina en forma intravenosa o intramuscular 1 - 2 mg en adultos, repetir si es necesario.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800-1-3040  
POINT ANDINA S.A. 348-1018/349-9609  
ESSALUD: 0801-10200 ó 107  
CISPROQUIM: 080-050-847

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS  
Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido del envase inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.  
Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.  
Peligroso para invertebrados acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.  
Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.  
No aplicar el producto en suelos con napa freática superficial.  
Respetar una banda de protección hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS  
NIÑOS**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**DALE 90 SP** es un insecticida carbamato sistémico de amplio espectro de acción.

**PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

CULTIVOS	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Técnico	Común	Kg/Ha	g/cil		
Tomate	<i>Spodoptera eridania</i>	Gusano del fruto	0.4	200	7	1
Maíz	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Cogollero	0.5 - 0.6	250-300	7	0.1
Espárrago	<i>Heliothis virescens</i>	Barrenador de brotes	0.4	200	1	2
Espárrago	<i>Spodoptera eridania</i>	Gusano cogollero	0.4	200	1	2
Espárrago	<i>Copitarsia turbata</i>	Copitarsia	0.4	200	1	2
Espárrago	<i>Thrips tabaci</i>	Trips	0.4	200	1	2
Pimiento	<i>Symmetrischema casicum</i>	Gusano del fruto	0.4	200	3	1
Pimiento	<i>Heliothis virescens</i>	Barrenador de brotes	0.4	200	3	1
Pimiento	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Spodoptera	0.4	200	3	1
Cebolla	<i>Thrips tabaci</i>	Trips	0.4 - 0.6	200-300	7	0.2
Alcachofa	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Cogollero	0.4	200	N.d	0.2
Alcachofa	<i>Heliothis virescens</i>	Barrenador de brotes	0.4	200	N.d	0.2
Sandía	<i>Diaphania nitidalis</i>	Perforador de guía	0.4 - 0.6	200-300	3	0.2
Palto	<i>Fiorinia fioriniae</i>	Fiorinia	-	200	1	0.05
Palto	<i>Thrips tabaci</i>	Trips	-	200	1	2
Palto	<i>Dagbertus minensis</i>	Chinche del palto	-	200	1	2
Col	<i>Plutella xylostella</i>	Gusano de hoja	0.4 - 0.6	200-300	3	0.05
Alfalfa	<i>Prodenia eridania</i>	Gusano ejército	-	200	7	10
Naranja	<i>Lepidosaphes beckii</i>	Queresa coma	-	200-300	3	1

P.C. = Periodo de carencia. L.M.R. = Límite Máximo de Residuos.  
N.d. = No determinado

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar en cualquier etapa del cultivo. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:** No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **DALE 90 SP** es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre.

**FITOTOXICIDAD:** **DALE 90 SP** no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

