

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazol.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y lleve al médico especialista: oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencias llamar a:

**CIPROSQUIM: 0800-5-0847. ESSALUD EN LÍNEA: 107 ó 0801-10200
FITOCORP: 6522182**



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable EC

Composición:

Difenoconazole	250 g/L
Aditivos	c.s.p 1L

Titular de Registro:
FITOCORP SAC
Jr. Las Poncianas N°147 Interior 2B Urb. La Molina vieja. La Molina - Lima
Teléfono: 016522182

Formulado por:
Hangzhou Udragon Chemical Co., LTD. No.172, Zhangjiadun Road, Tangxi Development Zone.



Lote N°:
Fecha de Producción:
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO



DAÑINO

DIFEZOL 250 EC es un fungicida sistémico de acción translaminar. Actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol de la membrana celular, lo que conlleva a la muerte del hongo.

DIFEZOL 250 EC se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a las dosis indicadas con la mitad del volumen de agua utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente.

El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo. No aplicar en campos con problemas de humedad o bajo estrés.

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/cil	L/ha		
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.15	0.30	7	0.5
Granada	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	0.2	-	14	0.1
Paprika	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	-	0.375	7	0.8

P.C: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se detecte los primeros inicios de la enfermedad. Dirigir las aplicaciones hacia los brotes. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. La segunda aplicación previa evaluación.

En caso se requiera una tercera aplicación, usar otro plaguicida de diferente mecanismo de acción.

COMPATIBILIDAD
DIFEZOL 250 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Es incompatible con ácidos y bases fuertes (pH <2 o pH>11).

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

