

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice la ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 12 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico: Dithiocarbamatos.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón si es posible con polietilenglicol 400 y después con agua.
- En caso de ingestión, no provocar al vómito, bríndele respiración artificial si es necesario. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.

**Nota al médico:** No tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

**CICOTOX: 08001-3040 CROP BUSINESS SAC: 349-2669**  
**CISPROQUIM: 0800-5-0847 ESSALUD: 117**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, destruya los envases y déjelos en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener a los animales fuera de la zona tratada.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o altamente permeables.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PROPICIO 70 PM** es un fungicida preventivo-protectante utilizado para el control de enfermedades causadas por hongos en diversos cultivos.

**PROPICIO 70 PM** es un fungicida de amplio espectro que interfiere en diferentes ubicaciones en el metabolismo de los hongos. Este modo de múltiples sitios de acción impide el desarrollo de resistencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Iniciar la aplicación de **PROPICIO 70 PM** cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14 días variando de acuerdo al cultivo y a la enfermedad.

En Arroz: para el control de "Helminthosporium", usar la menor dosis a inicios de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurridas 12 horas del tratamiento.

**COMPATIBILIDAD**

**PROPICIO 70 PM** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

**FITOTOXICIDAD**

**PROPICIO 70 PM** no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg/200 L	kg/Ha		
Espárrago	"Mancha púrpura"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.67	2.0	30	0.05
Papa	"Rancha" ó "Hielo"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5	1.0	7	0.05
Arroz	"Helminthosporium"	<i>Helminthosporium oryzae</i>	1.5 - 2.0	1.5 - 2.0	7	0.05

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Limite máximo de residuos



# PROPICIO 70 PM

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

**COMPOSICIÓN:**

Propineb ..... 700 g/kg  
Aditivos .....c.s.p. 1 Kg

**Reg PQUA N° 942 - SENASA**  
**Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.**

Importado y Distribuido por:  
**CROP BUSINESS S.A.C.**



Calle Toledo N° 161 Dpto. 201 Urbanización  
Mayorazgo IV Etapa - ATE - LIMA  
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

**Contenido Neto: 25 Kg**

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:  
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD  
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road  
Songjiang District - Shanghai  
CHINA

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**