

**Bolsa 100 g :**  
**Altura : 14 cm**  
**Ancho : 10 cm**

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**iskay**  
**70 WG**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

GRANULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid ..... 700 g/kg  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**PQA N° 946-SENASA**

Titular de Registro, Importado  
 y Distribuido por:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702.  
 Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 253-6444  
 atencionalcliente@grupoadina.com.pe

Formulado por:

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO, LTD.**

Oficina: piso 19th & 20th. Hanyu Financial Centre, Building A3-4,  
 No 7000 East Jingshi Road, Jinan, China 250101  
 Planta: Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong,  
 China 262737.

Contenido Neto: 100g

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑINO**

**"LEA ESTA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"  
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o la aspersión.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Cloronicotínico - Neonicotinoide
- En caso de intoxicación o indigestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quite la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.

**ANTIDOTO:** No tiene antídoto.  
**TELÉFONOS DE EMERGENCIAS**  
 En caso de emergencia llamar a CIPROSOQUIM: 0800-5-0847; ESSALUD: 107 o 0801-10200 / CAISAC: 253-6444.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entreguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos -10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Iskay® 70 WG** es un insecticida de contacto e ingestión, con acción sistémica. Actúa interfiriendo la transmisión de los estímulos nerviosos del sistema nervioso central de los insectos produciendo un desorden nervioso y la muerte.  
**Iskay® 70 WG** se aplica en aspersión con equipo aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.  
 Calibrar el equipo previamente y aplicar hasta lograr una buena cobertura de las plantas.  
 Debe regarse previamente el campo, antes de aplicar. No aplicar en campos con problemas de humedad o bajo estrés.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar previa evaluación de la plaga y en los primeros estadios.
- Usar la dosis mayor para ataques severos.
- Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año. La segunda aplicación previa evaluación de la plaga.
- En caso se requiera una tercera aplicación, usar otro plaguicida de diferente mecanismo de acción.
- No aplicar en época de floración, por ser muy peligroso para abejas.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de fitosanitarios, incompatible con agentes altamente ácidos o alcalinos.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a las dosis, y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGAS		Dosis g/cil	Dosis g/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Cebolla	"Thrips"	<i>Thrips tabaci</i>	-	250	n.d.	0.1
Fresa	"Thrips"	<i>Thrips tabaci</i>	100-125	-	7	0,05
Espárrago	"Mosca Blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	100-150	-	21	0,05
Arroz	"Cigarrita del virus de la hoja blanca"	<i>Tagosodes orizicolus</i>	100	-	15	0,05
Vid	"Cochinilla harinosa"	<i>Planococcus ficus</i>	-	1500	14	1

LMR: Límite Máximo de Residuos n.d.: No determinado PC: Periodo de carencia

