

Bolsa 500 g :

Altura : 27.5 cm  
Ancho : 20.5 cm



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**GRANULO DISPERSABLE - WG**

**COMPOSICIÓN:**

Imidacloprid ..... 700 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**PQUA N° 946-SENASA**



Titular de Registro, Importado y  
Distribuido por:  
**Comercial Andina  
Industrial S.A.C.**  
Av Benavides 1579. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18-Perú.  
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:  
**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO, LTD.**  
Oficina: piso 19th & 20th. Hanyu Financial Centre, Building A3-4,  
No 7000 East Jingshi Road, Jinan, China 250101  
Planta: Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong,  
China 262737.

**Contenido Neto: 500g**

Lote N°:  
F. de Form:  
F. de Venc:  
® Marca registrada

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o la aspersión.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Cloronicotínilo - Neonicotinoide**

- En caso de intoxicación o indigestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático

En caso de emergencia llamar a

**CIPROSQUIM: 0800-5-0847; ESSALUD: 107 ó 0801-10200**

**CAISAC: 253-6444.**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya este envase (bolsa y caja), perforándolo y deposítelo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Iskay® 70 WG** es un insecticida de contacto e ingestión, con acción sistémica. Actúa interfiriendo la transmisión de los estímulos nerviosos del sistema nervioso central de los insectos produciendo un desorden nervioso y la muerte.

**Iskay® 70 WG** se aplica en aspersión con equipo aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente y aplicar hasta lograr una buena cobertura de las plantas.

Debe regarse previamente el campo, antes de aplicar. No aplicar en campos con problemas de humedad o bajo estrés.

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

- Aplicar previa evaluación de la plaga y en los primeros estadios. Usar la dosis mayor para ataques severos.
- Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año. La segunda aplicación previa evaluación de la plaga.
- En caso se requiera una tercera aplicación, usar otro plaguicida de diferente mecanismo de acción.
- No aplicar en época de floración, por ser muy peligroso para abejas.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de fitosanitarios, incompatible con agentes altamente ácidos o alcalinos.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a las dosis, y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO   | PLAGAS                                      |                                 | Dosis<br>g /cil | Dosis<br>g /ha | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|           | Nombre Común                                | Nombre Científico               |                 |                |                |              |
| Cebolla   | “Thrips”                                    | <i>Thrips tabaci</i>            | -               | 250            | n.d.           | 0.1          |
| Fresa     | “Thrips”                                    | <i>Thrips tabaci</i>            | 100-125         | -              | 7              | 0,05         |
| Espárrago | “Mosca Blanca”                              | <i>Bemisia tabaci</i>           | 100-150         | -              | 21             | 0,05         |
| Arroz     | “Cigarrita del virus<br>de la hoja blanca ” | <i>Tagosodes<br/>orizicolus</i> | 100             | -              | 15             | 0,05         |

**LMR:** Límite Máximo de Residuos

**n.d.:** No determinado

**PC:** Periodo de carencia

