

Bolsa 1 Kg:

Altura : 34 cm
Ancho : 32 cm



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid 700 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

PQUA Nº 946-SENASA



Av. Benavides 1579, 7mo piso, Oficina 702.
Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:
SULPHUR MILLS LIMITED
604/605, 349- Business Point, Western Express Highway,
Andheri (East), Mumbai-400069. India.



Av. Benavides 1579, 7mo piso, Oficina 703, Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote Nº:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

Contenido Neto: 1kg

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o la aspersión.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni trasportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Cloronicotínilo - Neonicotinoide

- En caso de intoxicación o indigestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático

En caso de emergencia llamar a

CIPROSQUIM: 0800-5-0847; ESSALUD: 107 ó 0801-10200

CAISAC: 253-6444.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase (bolsa y caja), perforándolo y deposítelo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Iskay® 70 WG es un insecticida de contacto e ingestión, con acción sistémica. Actúa interfiriendo la transmisión de los estímulos nerviosos del sistema nervioso central de los insectos produciendo un desorden nervioso y la muerte.

Iskay® 70 WG se aplica en aspersión con equipo aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente y aplicar hasta lograr una buena cobertura de las plantas.

Debe regarse previamente el campo, antes de aplicar. No aplicar en campos con problemas de humedad o bajo estrés.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga y en los primeros estadios. Usar la dosis mayor para ataques severos.
- Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año. La segunda aplicación previa evaluación de la plaga.
- En caso se requiera una tercera aplicación, usar otro plaguicida de diferente mecanismo de acción.
- No aplicar en época de floración, por ser muy peligroso para abejas.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de fitosanitarios, incompatible con agentes altamente ácidos o alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis, y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		Dosis g /cil	Dosis g /ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Cebolla	“Thrips”	<i>Thrips tabaci</i>	-	250	n.d.	0.1
Fresa	“Thrips”	<i>Thrips tabaci</i>	100-125	-	7	0,05
Esparrago	“Mosca Blanca”	<i>Bemisia tabaci</i>	100-150	-	21	0,05
Arroz	“Cigarrita del virus de la hoja blanca ”	<i>Tagosodes orizicolus</i>	100	-	15	0,05

LMR: Límite Máximo de Residuos

n.d.: No determinado

PC: Periodo de carencia

