

Evisect®-S

Evisect®-S

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezclas y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Análogo de la nereistoxina.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrole la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel y los ojos lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a las dosis de 12,5 a 25 mg por kilogramo de peso.

Teléfonos de emergencia toxicológica:

CICOTOX: 0800-1-3040

ALO EsSalud: 472-2300 (emergencias 24 horas)

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

Composición:

Thiocyclam-hydrogenoxalato 500 g/kg
Aditivosc.s.p. 1 kg

Reg. Nº 109-96-AG-SENASA

Importado y Distribuido por:



QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL
DEL PERU S.A.



Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima - Perú.
Telf. 710-4000

Contenido Neto: 400 g

Formulado por:

FORMULACIONES QUIMICAS S.A.

CHOMES-Punta Arenas
Telf.: 638-8283 - Costa Rica



Titular del Registro

Arysta LifeScience

Harmony In Growth

Av. Arenales 395 of. 603, Lima 1,
Telf. 332-6633

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



Moderadamente Peligroso
DAÑINO

Evisect®-S

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase, y deposítelo en lo sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

No utilice este envase para conservar alimentos o agua.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrante del producto.

ESPEJOS GRAF SAC	FECHA:	18-09-2013	COLORES: NEGRO  PANT. AMARILLO C.  PANT. 293 C  PANT. ROJO  QUIMICA SUIZA	OBSERVACIONES:	
	VERSION:	UV:1			
	CLIENTE:	QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL S.A.			
	FORMATO:				
	CAJA EIVSETCT - S x 800 g				
	MEDIDAS:				
17 cm x 15 cm x 10.5 cm		PROGRAMA:	OPERADOR:		
		COREL 16	JORGE QUISPE LUQUE		

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Evisect-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: *Lumbrineris spp.*), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores. Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aprox., agitar y verter esta pre-mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	Kg/cil	%		
Aji, Pimiento	Gusano Perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	----	N.D.	3
	Mosca Minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	----	N.D.	3
Alcachofa	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>					
	Perforador de la hoja	<i>Bucculatrix thurberiella</i>	0.5	----	----	15	0.02
Algodón	Gusano mayor de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>					
	Gusano menor de la hoja	<i>Anomis texana</i>	----	0.1	0.05	N.D.	3
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>					
	Gusano defoliador	<i>Heliothis virescens</i>	0.20-0.40	0.10-0.20	----	N.D.	3
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>					
	Gusano defoliador	<i>Copitarsia turbata</i>	----	0.1	0.05	N.D.	3
Granado	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>					
	Trips del palto	<i>Heliothrips haemorrhoidales</i>	----	0.1	0.05	N.D.	3
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	0.70	0.35	----	15	3
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	----	14	3
Vid	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	----	0.1	0.05	14	3

PC: Periodo de Carenia / N.D.: No determinado / LMR: Límite Máximo de Residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos **Evisect-S** debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo.

La aplicación en el cultivo del algodón debe efectuarse con estadíos larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas esté afectados.

En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infestados y/o con estadíos larvarios 1 y 2.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Evisect-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

Evisect-S no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



