

105.00 mm

EVISECT®-S

EVISECT®-S

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Análogo de la nereis toxina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- **Antídoto:** Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a la dosis de 12,5 a 25 mg por kilogramo de peso.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
CISPROQUIM: 080-050-847
Teléfono de la empresa: (01) 221-5729

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

EVISECT®-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:	
Thiocyclam-hidrogenoxalato.....	500 g/kg
Aditivos.....	c.s.p. 1kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA

Titular del Registro: **ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.**
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima - Perú

 **Arysta**
LifeScience
Innovation. Agility. Results.

Formulador: Formulaciones Químicas S.A.
CHOMES-Puntarenas
Telf.: 638-8283 - Costa Rica

Importador y Distribuidor: SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Telf. 710-4068

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: **400 g**
Fecha de vencimiento:

®Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

EVISECT®-S

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes de producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

EVISECT-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: *Lumbrineris spp.*), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores.

Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente., agitar y verter esta pre mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

Consulte con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/cil	%		
Ají, Pimiento	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
Alcachofa	Mosca minadora	<i>Lirionyx huidobrensis</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	N.D.	3
	Gusano defolador	<i>Heliothis virescens</i>					
	Perforador de la hoja	<i>Bucculatrix truerberryella</i>					
Algodón	Gusano mayor de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>	0.5	-----	-----	15	0.02
	Gusano menor de la hoja	<i>Anomis texana</i>					
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05	N.D.	3
	Gusano defolador	<i>Heliothis virescens</i>					
	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.20-0.40	0.10-0.20	-----	N.D.	3
	Gusano defolador	<i>Capitarsia turbata</i>					
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05		
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.15-0.20	0.075-0.1	14	3
Granado	Thrips del palto	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>	-----	0.1	0.05	N.D.	3
Palto	Pollita	<i>Tuta absoluta</i>	0.70	0.35	-----	15	3
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.30-0.40	0.15-0.20	-----	15	3
Vid	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	0.1	0.05	14	3
	Pollita de la papa	<i>Phthorimaea operculella</i>	0.60	-----	-----	N.D.	0.01
Papa	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.20-0.30	-----	-----	N.D.	0.01

P.C.: Periodo de Carencia / N.D.: No determinado / LMR: Límite máximo de residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos **EVISECT®-S** debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo de algodónero deberá efectuarse con estadios larvarios 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas estén afectadas. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes infectados y/o con estadios larvarios 1 y 2.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

EVISECT®-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

EVISECT®-S La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos..

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

