MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ETHPYRI 400 SC

PLAGUICIDA QUÍIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

PQUA Nº 947 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A. C

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú. Teléfono: (01) 678-9544



FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.

Binhai Economic Development Area Weifang, Shandong 262737, China.

Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231 E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com https://www.rainbowagro.com/

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: SOLANDINA PERU SAC

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: +51 992 763 127

Contenido neto: 20 L

Lote No.:

Fecha de Formulación: Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere. -Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. -Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Anillinopyrimidine.
- En caso de contacto cutáneo: retirar la ropa contaminada y lavar la piel expuesta con abundante aqua fría y jabón.
- En caso de contacto ocular: lavar bien los ojos con agua limpia, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos.
- En caso de ingestión: Administrar 2 tazas de agua y no provocar vómitos ya que el compuesto es de baja toxicidad y se pueden generar complicaciones pulmonares.
- Mantenga al paciente en descanso mientras espera el traslado al hospital más cercano. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto.
- En caso de ingestión reciente del producto preparar una solución de suero salino y proceder al lavado gástrico y aspiración. Finalmente administrar 15 g de carbón activado (absorbente) en una solución de 20g de sulfato de sodio (laxante) con 500 ml de agua.
- Antídotos: No se requiere de antídotos. Un tratamiento médico oportuno asegura un buen pronóstico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 RAINBOW AGROSCIENCES: (01) 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutiticelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ETHPYRI 400 SC es un fungicida sistémico y translaminar usado para el control de Botrytis cinerea en pimiento y vid. Actúa inhibiendo la secreción de proteínas del patógeno, también reduce los niveles de algunas enzimas hidrolíticas que participan en la penetración y en la necrosis de los tejidos afectados.

ETHPYRI 400 SC se prepara haciendo una premezcla de la dosis recomendada en la mitad del volumen de agua, agitar bien y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. Puede aplicarse con cualquier equipo de aplicación terrestre. La absorción de ETHPYRI 400 SC puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante adecuado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Cultivo	Plaga		Dosis	PC	LMR
	N. Común	N. científico	L/200L	(días)	(ppm)
Pimiento	Podredumbre gris / Moho gris	Botrytis cinerea	0.25	56	0.05
Vid	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.2*	7	4

PC: Periodo de Carencia *Gasto de agua: 1000L/Ha LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar máximo dos aplicaciones por campaña, considerando una campaña al año para el cultivo de pimiento y vid. La aplicación se debe realizar cuando las condiciones ambientales favorecen el desarrollo de la enfermedad o se presentan los primeros síntomas.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar a la zona tratada después de 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ETHPYRI 400 SC es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común, excepto con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

























