

7.7 cm

0.7 cm

21.0 cm

0.5 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Extremadamente tóxico por ingestión. Es letal si es ingerido.
- Puede ser letal si inhalado, es extremadamente peligroso e irritante al tracto respiratorio, evite la aspersión.
- El producto es irritante y nocivo en contacto con los ojos, puede producir quemosis en la conjuntiva, usar equipo de protección ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- No utilizar ni manipular el producto por personas en gestación.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Carbamato
- En caso de intoxicación por ingestión lleve al paciente al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta, seguir instrucciones indicadas.

Antídoto: Sulfato de atropina.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 08001-3040 BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002 CISPROQUIM: 0800-5-0847

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficiosos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No permitir animales en el área tratada. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.



# BIOXAMYL®

## 240 SL

INSECTICIDA-NEMATICIDA AGRÍCOLA  
CONCENTRADO SOLUBLE - SL

#### COMPOSICIÓN:

Oxamyl ..... 240 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

Reg. PQUA N° 672 - SENASA

Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC

Importado y distribuido por:

BIOAGROCORP TRADING SAC



Calle Los Flamencos N° 121 Interior 6 - Santa Anita

Teléfono: 478-2002 / Fax: 362-0014

Formulado por:

SHANGHAI-TONGCHEMICAL CO., LTD

N° 23 Lane 5398, Shenzhuan Road,

Songjiang District - Shanghai

CHINA

N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

Contenido neto: 250 ml

NO CORROSIVO



INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BIOXAMYL 240 SL es un insecticida-nematicida del grupo de los carbamatos, de amplio espectro, que actúa por contacto e ingestión. Actúa inhibiendo la colinesterasa e interfiriendo la transmisión de los impulsos nerviosos, lo que causa la pérdida de coordinación muscular, convulsiones y finalmente la muerte de la plaga.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

#### CUADRO DE USOS:

| CULTIVO | PLAGAS                       |                              | DOSIS   |      | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|---------|------------------------------|------------------------------|---------|------|----------------|-----------------|
|         | Nombre Común                 | Nombre Técnico               | L/200 L | L/Ha |                |                 |
| Algodón | Pulgón                       | <i>Aphis gossypii</i>        | 1.0     | 2.5  | 14             | 0.2             |
| Papa    | Pulgón                       | <i>Aphis gossypii</i>        | 1.0     | 2.0  | 7              | 0.1             |
| Vid     | Nemátodo del nudo de la raíz | <i>Meloidogyne incognita</i> | 1.0     | 3.0  | 14             | 0.01            |

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:** La aplicación se efectuará previa evaluación del campo de cultivo, después de la siembra cuando la planta tenga entre 3-4 hojas verdaderas (etapa inicial del crecimiento vegetativo).

Efectuar como máximo 1 aplicación por campaña/año.

No aplicar en época de floración, por ser muy tóxico para abejas.

**FITOTOXICIDAD:** BIOXAMYL 240 SL no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.



**EXTREMADAMENTE PELIGROSO**  
**MUY TÓXICO**



1.20 cm