

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE EN SU LUGAR, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
  - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
  - Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación y lavar inmediatamente las manos con abundante agua y jabón.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni ferrejas.
  - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Dinitroanilina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o llame al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavelos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada ni induzca al vomito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No se conoce antídoto específico. Siga tratamiento sintomático.

CICTOXY: 989, TELONOS DE EMERGENCIA  
CSIPROQUIM: 980-50-347 ALOSAJUD: 081-10200 (Gratuito)

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y ventile la estación en la mezcla de agua para evitar la contaminación del medio ambiente.
  - No arrojar el producto ni el envase vacío a la basura.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, esteros o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Resguardar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Evitar la aplicación en zonas de reproducción de aves silvestres.
- Evitar la aplicación en zonas de reproducción de peces.
- Evitar que el producto caiga sobre cultivos de otros agricultores.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- Utilizar una banda de protección hacia fuentes de agua no menor a 3 metros.



# SELLADOR 400 EC

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICIÓN:**

Pandimethalin: 400 g/L  
C.s.p. 1 L

Título del Registro, Imprenta y distribuido por:  
NEOAGRIUM S.A.C.



Contenido neto: 100 L

Fornecido por:  
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO. LTD  
54 Riverside Wharf Road, Changhe Town,  
Hangzhou, Zhejiang Province - CHINA  
F. de Lab.:  
F. de Ven.:  
NO CORROSIVO  
NO INFLAMABLE  
NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

SELLADOR 400 EC es un herbicida selectivo que puede ser aplicado en pre-emergencia y/o post-emergencia. Actúa inhibiendo la división celular durante la mitosis. SELLADOR 400 EC debe ser aplicado sobre suelo húmedo en pre-emergencia de las malezas. Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (manuales o equipos secundarios por tracción). Preparación de la mezcla: Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de SELLADOR 400 EC y completar con agua agitando constantemente hasta lograr una emulsión. **CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO\***

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	MALEZAS			P.C. L.M.A. (g/L)
	Nombre Común	Nombre Técnico	DOSIS (L/ha)	
Arroz	Volvoja Hacha negra CENSA	Pantuflo de arroz Solimón negro Mecosa triflorada	1,5	3,0
Caña de azúcar	Hacha negro CENSA CENSA CENSA	Chiriquito negro Chiriquito negro Chiriquito negro Chiriquito negro	1,25	2,5
Cebada	Paño de jabón Lupulino Cebadillo	Espartero negro Lupulino negro Lupulino negro	2,0	4,0
Espárrago	Hacha negro	Administrador negro	-	1,0

P.C.: Pre-emergencia

L.M.A.: Ligeramente peligroso

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** En cultivos de siembra directa aplicar SELLADOR 400 EC inmediatamente después de la siembra. En cultivos de siembra que se siembran SELLADOR 400 EC en pre-emergencia. Aplicar inmediatamente después de la siembra. **PERIODO DE TIEMPO:** No ingresar al campo hasta antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPARIBILIDAD:** El producto puede ser utilizado con los herbicidas de uso residencial excepto con aquellos de acción residual. **RESISTENCIA:** SELLADOR 400 EC no resiste a ser aplicado en los momentos y/o dosis recomendadas. **RESPONSABILIDAD:** El fabricante no se responsabiliza por los daños ocasionados al usuario que no se ajusten a las instrucciones de uso y/o indicaciones de la etiqueta y que no concuerden con las recomendaciones, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.