ARISTOCRAT®

50 SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS SOLUBLES - SG

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate..... 52.64 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° 825 - SENASA

Titular del registro:
POINT ANDINA S.A.
Calle Los Tulipanes 147
Oficina 701-B, Santiago de Surco
Lima - Perú.
Teléfono +51 (01) 348 1018

Formulado por:
POINT AGRO-CHINA Ltd
Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu, 214217 China
Tel. (86-510)8785 1001

Soltagro®
Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

Importado y Distribuido por:
Soluciones Técnicas del Agro S.A.C
Av. Guillermo Dansey N°2176
Lima - Cercado
Telf: (01) 3368645 Fax: (01) 3368299

Contenido Neto: 100g

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
• Tóxico por ingestión. • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.• Utilizar camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascara y guantes durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.• Posibles riesgos de efectos irreversibles por inhalación. • Almacenar el producto en lugar sombreado seco y ventilado en sus envases originales bien cerrados, lejos de la luz directa. • No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes. • Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón. • Realice la operación siguiendo la dirección del viento. • En caso de incendio se generan gases tóxicos y/o irritantes; usar respirador o máscara de protección.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS: • Grupo Químico: Avermectinas. • En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muestrele la etiqueta o la hoja informativa adjunta. • No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.• En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional en salud. • En caso de contacto con los ojos y la piel, enjuagarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. • En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear la respiración, si fuera necesario practicar respiración artificial.

Teléfonos de Emergencia: SAMU:106,
CICOTOX:(01) 328- 7700, POINT ANDINA S.A.:348 1018

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: • Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración. • Peligroso para organismos acuáticos. • No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de los envases vacíos. • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación sobrante del producto. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

• No permitir animales en el área tratada. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. • El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. • El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. • En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: ARISTOCRAT 50 SG es un insecticida de contacto e ingestión. Cuando la larva ingiere el producto presente en el tejido vegetal (de 1 a 4 horas) la larva deja de alimentarse deteniendo así el daño que pueda estar ocasionando. Entre 12 y 24 horas más tarde son incapaces de moverse y quedan irreversiblemente paralizadas causando la muerte del insecto. Para la aplicación de **ARISTOCRAT 50 SG**, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con mochila mecánica o a motor. No hacer aplicaciones consecutivas de ARISTOCRAT 50 SG. Se recomienda hacer las aplicaciones en un programa que incluya productos de diferente modo de acción y así evitar la aparición de resistencia. **FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** De acuerdo a la incidencia (monitoreo) del insecto. Aplicar a la floración y fructificación. En los cultivos de pimiento y esparrago se tiene 2 campañas/año, se recomienda 1 aplicacion/campaña en pimiento y 2 aplicaciones/campaña en espárrago. Para el cultivo de arándano se recomienda 1 sola aplicación/campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar a las 24 horas después de aplicado el producto. **COMPATIBILIDAD: ARISTOCRAT 50 SG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de reacción neutra. **FITOTOXICIDAD: ARISTOCRAT 50 SG** no es fitotóxico cuando se utiliza como es indicado en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/cil 200 L	g/ha		
Arándano	Perforador del fruto	*Heliothis virescens*	100	-	5	0.01
Espárrago	Copitarsia	*Copitarsia corruda*	-	300	7	0.01
Pimiento	Perforador del fruto	*Heliothis virescens*	-	200	7	0.01

P.C.: Período de Carencia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA