



Ronstar[®] 25 EC

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Oxadiazon, 250g/L
Aditivos, csp 1 L

Reg. N° 209-96-AG-SENASA

Formulado por:
Bayer S.A
Av. Américas 57-52 Bogotá
DC- Colombia

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro. Lima - Perú

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro, Lima - Perú,
Telf. 211 3800

NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**Contenido
Neto: 20 litros**

Lote N°:
Fecha de
Formulación:
Fecha de
Vencimiento:

NO IMPRIME
Área reservada de brillo



® = Marca Registrada del grupo Bayer

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

PDF CERTIFICADO	Ref. Etiqueta Anverso 20 Litros
Producto: Ronstar 25 EC	País: Perú
Fecha: Febrero 17 de 2014	Tamaño: 200 mm x 140 mm

TINTAS CMYK(4)	
Cian	Amarillo
Magenta	Negro

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Durante el manipuleo del producto, no comer, beber, ni fumar. Evite su contacto con la piel y prolongada inhalación. Use guantes y máscaras protectoras.

No se debe ingerir.

Terminadas las labores, deben lavarse con abundante agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al producto y cambiarse de ropa.

No trate de desatorar los equipos soplando con la boca.

No transporte ni almacene este producto junto con comestibles, bebidas o medicinas de uso humano.

Evítese la contaminación de alimentos y medicinas para uso humano y animal, así como semillas, forrajes, fertilizantes, implementos agrícolas, acequias y drenajes.

Las aplicaciones de este producto deben realizarse de acuerdo a la reglamentación de uso de herbicidas.

Destruya este envase inmediatamente después de usar el producto.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Oxadiazole

En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llamar al médico, mientras tanto retire al paciente de la labor para que no continúe en contacto con el producto, colocándolo en un lugar bien ventilado, quitarle la ropa y lavar con agua limpia y jabón todas las partes del cuerpo que hubieran sido contaminadas. Enjuagar bien los ojos con bastante agua limpia y fresca.

ANTIDOTO:

No tiene antídoto específico, por lo que el médico instituirá el tratamiento sintomático correspondiente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION:

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPPOQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.

GENERALIDADES:

RONSTAR 25 EC es un herbicida pre-emergente selectivo para los cultivos de arroz, cebolla y algodón; que controla malezas gramíneas, de hoja ancha y cyperáceas en estos cultivos.

USO ESPECÍFICO:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		l / ha		PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	S. directa	Transplante		
Arroz	Moco de pavo	<i>Echinochloa cursgalli</i>	Costa	Costa	Se recomienda no aplicarlo 60 días antes de la cosecha	Grano 0,05
	Gramma lefe	<i>Echinochloa colonum</i>	3,0 - 4,0	2,5 - 3,0		
	Pata de gallina	<i>Fleusine indica</i>	Jaén	Jaén		
	Pajilla	<i>Chloris radicata</i>	2,5 - 3,0	2,0 - 2,5		
Cebolla	Plumilla	<i>Leptochloa unineruia</i>	2,0 - 2,5	2,0 - 3,0	60	Paja 0,02
	Mazorquilla	<i>Ischaemum rugosum</i>				
	Digitaria	<i>Digitaria sanguinalis</i>				
	Rabo de zorro	<i>Setaria verticillata</i>				
Algodón	Pisito	<i>Eleocharis geniculata</i>	2,0 - 2,5	2,0 - 3,0		
	Coco	<i>Cyperus difformis</i>				
Pimiento	Yuyo hembra	<i>Amaranthus gracilis</i>	2,0 - 2,5	2,0 - 3,0		
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	2,0 - 3,0	--		
Vid	Botoncito	<i>Eclipta alva</i>	2,0 - 3,0	--		
	Clavo de agua	<i>Jussiaea linifolia</i>	--	--	1,75 - 2,0	0,05

*PC = Período de carencia (días) **LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION: RONSTAR 25 EC es un herbicida pre-emergente que debe ubicarse uniformemente en el suelo para una acción eficiente, requiere una buena preparación de éste para que la superficie esté mollida y no haya terrones al momento de la aplicación.

A) ARROZ DE TRANSPLANTE: Aplique **RONSTAR 25 EC** a la dosis recomendada de 2 días a 8 días después de realizado el transplante, manteniendo el suelo drenado (sin agua), pero húmedo; (al estado barro) El agua de las pozas debe ser repuesta 48 horas después de la aplicación y luego se seguirá el manejo normal del riego.

B) ARROZ DE SIEMBRA DIRECTA: En siembras mecánicas o al "voleo" use **RONSTAR 25 EC** a la dosis recomendada sobre el suelo preparado y húmedo (barro) 2 días a 8 días después del primer riego de germinación, osea un poco antes de la emergencia del arroz y de las malezas; no aplique con más del 20% del arroz emergido o "pujado".

En estos sistemas de siembra, es muy importante mantener la humedad del suelo después de la aplicación, ya que ésta es esencial para una buena acción del producto, evítese resecamiento del campo que agriete el suelo, ya que ello hace posible la emergencia de malezas que se encuentran, por debajo de la capa protectora de **RONSTAR 25 EC**.

C) CEBOLLA DE SIEMBRA DIRECTA: Aplíquese **RONSTAR 25 EC** a la dosis recomendada desde que la cebolla ha desarrollado 1 hoja y ésta esté completamente erecta (después del estado de "corchete") en adelante; sobre un suelo húmedo.

D) CEBOLLA DE TRANSPLANTE: Aplíquese **RONSTAR 25 EC** a la dosis recomendada inmediatamente después del transplante; sobre suelo húmedo, con el riego que se da después del transplante.

E) ALGODÓN: En algodón de siembra, en terreno seco con riego de germinación, se puede aplicar **RONSTAR 25 EC** a la dosis recomendada en pre-emergencia neta del cultivo y las malezas sobre un suelo húmedo dado con el riego de germinación; después maneje normalmente su cultivo.

PERIODO DE REENTRADA: 24 horas.

INCOMPATIBILIDAD: Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas.

FITOTOXICIDAD: Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Bayer



PDF CERTIFICADO	Ref. Etiqueta Reverso 20 Litros
Producto: Ronstar 25 EC	País: Perú
Fecha: Febrero 17 de 2014	Tamaño: 200 mm x 140 mm

TINTAS CMYK(4)

