



Merlin® 75WG

HERBICIDA AGRICOLA

Gránulos Dispersables (WG)

Isoxaflutole, 750 g/kg

Ingredientes inertes, 250 g/kg

Reg. N° 386-97-AG-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San isidro.

Formulado por:

Schirm GmbH
Division Sideco
Mecklenburger Str. 229
23568 Luebeck
Alemania

Importado y distribuido por:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Telf: 2113800

**NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO**

Contenido Neto:

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada del grupo Bayer

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Antes de usar el producto lea cuidadosamente esta etiqueta y siga sus instrucciones.
Evite su contacto con la piel y prolongada inhalación, use máscaras y guantes protectores.
Durante el manipuleo del producto, no comer, beber ni fumar.
Terminadas las labores, deben lavarse con agua y jabón principalmente las partes expuestas al producto y cambiarse de ropa.
No transporte ni almacene este producto junto con comestibles, bebidas o medicinas de uso humano.
Evítese la contaminación de alimentos y medicinas para uso humano y animal.
Destruya los envases vacíos.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Isoxazol
En caso de intoxicación por ingestión, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta o administrando un vaso de agua tibia salada. Lleve al paciente con el médico y muéstrela la etiqueta. En caso de contacto, lávese bien la piel con agua abundante y jabón, y los ojos con bastante agua corriente. Solicite atención médica para los ojos.

ANTIDOTO: Tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION:

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.

INFORMACION GENERAL:

MERLIN 75 WG es un herbicida pre-emergente a base de isoxaflutole al 75% WG, pertenece a una nueva familia química, los isoxazoles, que se caracterizan por su alta efectividad a bajas dosis y su amplio espectro.

INDICACIONES DE USO:

MERLIN 75 WG puede ser aplicado en pre-emergencia (antes de la germinación de la caña y malezas) y en post-emergencia temprana (antes de la germinación de la caña y malezas emergidas de 2 a 4 hojas). Para complementar el espectro de control sobre malezas de hoja ancha conviene hacer una mezcla de tanque con ametrina. Algunas veces, después de la pulverización pueden aparecer las primeras hojas de la caña ligeramente cloróticas, sobre todo cuando hay humedad en exceso; esta clorosis desaparecerá mientras la caña continúa creciendo normalmente.

MODO DE PREPARACION:

Mezclar la cantidad de MERLIN 75 WG con el apropiado volumen de agua limpia, luego agregarle Rhonetrin 500 SC (Ametrina) y mezclar de acuerdo al tipo de máquina a ser usada. El volumen de agua recomendado es de 200 a 300 litros por hectárea para bombas de mochila y de tractor, de 12 a 15 galones de agua por hectárea para aplicaciones aéreas.

PERIODO DE REENTRADA: 24 horas

INCOMPATIBILIDAD:

No presenta con los plaguicidas más comunes.

FITOTOXICIDAD:

Tiene muy buena fitocompatibilidad con caña de azúcar. Evite que el viento arrastre las pulverizaciones hacia cultivos vecinos. Todas las precauciones usuales deberán ser tomadas contra la contaminación de cultivos vecinos susceptibles.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

USOS ESPECIFICOS:

CULTIVO	M A L E Z A S		Dosis de Producto Comercial kg / ha	PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Técnico	Nombre Común			
Caña de Azúcar	Chloris gayana Cenchrus echinatus Paspalum haenkeanum Eleusine indica Leptochloa Uninervia Echinochloa colonum Flaveria bidentis Sida spinosa Portulaca oleracea Euphorbia spp. Amaranthus spinosus Cyperus diffusus	Pajilla Cadillo Manga Larga Pata de Gallina Leptocloa Champa Escoba Amarilla Sida Verdolaga Lechera Yuyo Macho Coquito	0,150	Dado que las aplicaciones son en pre-emergencia no se indica el N° de días entre la aplicación y la cosecha. No obstante se recomienda no aplicarlos a 5 semanas de la cosecha	0,1

PC = Periodo de carencia (días)

LMR = Límite máximo de residuos (en ppm)

