LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Causa irritación moderada a los oios.

-Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo.

- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con

abundante agua y jabón.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.

- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni

- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en

las primeras 24 horas.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

- No re-envasar o depositar el contenido en otros envases.

- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. - CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, POSIBLE CARCINÓGENO.

- Grupo Químico: Fenoxiacéticos

-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

En caso de ingestión, enjuagar la boca con abundante agua. No dar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. No inducir el vómito a menos que sea indicado por el médico.

menos que sea indicado por ei metico.
- En caso de inhalación, sacar a la víctima al aire libre, si la respiración es dificultosa dar oxigeno. Buscar ayuda médica y mostrar la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, inmediatamente lavarse con abundante agua y jabón. Consultar al médico.
- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia por lo menos


durante 15 minutos. Consultar al médico.

Nota al médico: No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos: ESSALUD EN INIAE: 411-8000 (DPCION 4) CISPROQUIM: 0800-50847 CICOTOX:0800-13-040 / 328-7700 CETOX: 0800-71911

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

 Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

-Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas. -No contaminar rios, estanques o arroyos con los desechos o envases vacios. -No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en

suelos altamente permeables.
-En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia las aguas subterráneas

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

2.4 D Sal amina......720 g/L Aditivoscsp 1 L

Reg. PQUA Nº 624 - SENASA

Titular del Registro:

Sociedad Anónima Fausto Piaggio

Formulado por: ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT AND EXPORT CORPORATION No. 37 Qing Chun Road, Hangzhou. Zheijang Province, P.R. China

Importado y distribuido por: **DIVISIÓN AGRÍCOLA** SOCIEDAD ANONIMA Jausto Piagaio

Av. Guillermo Dansey 2045 Cercado de Lima. Perú Telf: 464-2222 Fax: 464-2211 e-mail: ventas@piaggio.com.pe RUC: 20100244471

Contenido Neto: 500 ml

EL GRAN AMIGO DEL AGRICULTOR

Lote No: Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RASAR es un herbicida hormonal, selectivo, sistémico, post emergente usado en malezas de

hoja ancha en cultivos anuales y perennes.

RASAR al entrar en contacto con las malezas es absorbido y translocado hacia las zonas meristernáticas de brotes y raíces, alterando su metabolismo; lo cual provoca al inicio una severa epinastia en hojas, tallos y peciolos, posteriormente la muerte de la meigra Disolver previamente RASAR en un recipiente con agua, mezciar homogéneamente, luego

agregar al cilindro o mochila (según sea el caso) y completar con agua hasta alcanzar el volumen

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	PLAGA		1/0001		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200L	L/ha	(días)	(ppm)
Arroz	Amor Seco	Bidens pilosa	750	-	60	0.1
	Coquito	Cyperus rotundus	500 -750	-		
	Echinochloa	Echinochloa crus-pavonis	750	-		
	Pata de gallina	Eleusine indica	750	-		
	Verdolaga blanca	Trianthema portulacastrum	750	-		
Caña de azúcar	Amor Seco	Bidens pilosa	-	1.5	88	0.05
	Capulí cimarrón	Nicandra physalodes				
	Lechera	Euphorbia peplus				
	Verdolaga	Portulaca oleracea				
	Yuyo	Amaranthus spinosus				
Maíz	Chamico	Datura stramonium	750	2	45	0.05
	Capulí cimarrón	Nicandra physalodes				
	Verdolaga	Portulaca oleracea				
	Yuyo macho	Amaranthus spinosus				

PC: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: En maíz se recomienda aplicar el producto durante las primeras fases de crecimiento (Desarrollo vegetativo) hasta que el cultivo alcance los 20 – 25 ias primetas lasse de declimiento (Desartilon Vegetariuv) flasta que el cuinvo alcanto de 32 – 25 om de altura (2-8 hojas), postenormente la aplicación debe ser dirigida a las malezas. Se recomienda además que las malezas a controlar se encuentren en los primeros estados fenológicos, es decir cuando tengan alrededor de 3 – 4 hojas verdaderas. Realizar un máximo de una aplicación por campaña/año. El gasto máximo de aqual-flectárea es 540 litros. En caña se recomienda aplicar el producto durante el desarrollo vegetativo del cultivo y cuando

las malezas se encuentren en activo crecimiento cuando tengan alirededor de 3 – 4 hojas verdaderas. Realizar un máximo de una aplicación por campaña/año. El gasto máximo de agua/Hectárea es 400 litros. En **arroz** se recomienda aplicar el producto durante el desarrollo vedetativo v cuando las malezas se encuentren en activo crecimiento (desarrollo de hoias). Realizar como máximo una aplicación por campaña/año. El gasto máximo de agua/Hectárea es

200 litros.

PERIODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la

COMPATIBILIDAD: Este producto es incompatible con agentes altamente oxidantes.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico usado a las dosis recomendadas y en los cultivos

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase concuerdan con la descripción indicada en la etiqueta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo





















con las condiciones e instrucciones dadas.









