

30 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, POSIBLE CARCINÓGENO.

PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo Químico: Fenoxiacéticos

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con abundante agua. No dar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. No inducir el vómito a menos que sea indicado por el médico.
- En caso de inhalación, sacar a la víctima al aire libre, si la respiración es dificultosa dar oxígeno. Buscar ayuda médica y mostrar la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, inmediatamente lavarse con abundante agua y jabón. Consultar al médico.
- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Consultar al médico.
- Nota al médico: No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:
ESSALUD EN LINEA: 411-8000 (OPCIÓN 4) CISPROMQUIM: 0800-50847
CICOTOX: 0800-13-040 / 328-7700 CETOX: 0800-71911

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia las aguas subterráneas.

RASAR

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

2,4 D Sal amina 720 g/L
Aditivos csp 1 L

Reg. PQUA N° 624 - SENASA

Titular del Registro:
Sociedad Anónima Fausto Piaggio



Contenido Neto: 5 L

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT
AND EXPORT CORPORATION

No. 37 Qing Chun Road, Hangzhou,
Zhejiang Province, P.R. China.

Importado y distribuido por:
SOCIEDAD ANONIMA *Fausto Piaggio*

Av. Guillermo Dansey 2045
Cercado de Lima, Perú
Telf: 464-2222 Fax: 464-2211
e-mail: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RASAR es un herbicida hormonal, selectivo, sistémico, post emergente usado en malezas de hoja ancha en cultivos anuales y perennes.
RASAR al entrar en contacto con las malezas es absorbido y translocado hacia las zonas meristemáticas de brotes y raíces, alterando su metabolismo; lo cual provoca al inicio una severa epinastia en hojas, tallos y peciolo, posteriormente la muerte de la maleza.
Disolver previamente **RASAR** en un recipiente con agua, mezclar homogéneamente, luego agregar al cilindro o mochila (según sea el caso) y completar con agua hasta alcanzar el volumen requerido

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	PLAGA		ml/200L	L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Arroz	Amor Seco	<i>Bidens pilosa</i>	750	-	60	0.1
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	500-750	-		
	Echinochloa	<i>Echinochloa crus-galis</i>	750	-		
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	750	-		
	Verdolaga blanca	<i>Trianthema portulacastrum</i>	750	-		
Caña de azúcar	Amor Seco	<i>Bidens pilosa</i>	-	1.5	88	0.05
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>				
	Lechera	<i>Euphorbia peplus</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Yuyo	<i>Amaranthus spinosus</i>				
Maíz	Chamico	<i>Datura stramonium</i>	750	2	45	0.05
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Yuyo macho	<i>Amaranthus spinosus</i>				

PC: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: En maíz se recomienda aplicar el producto durante las primeras fases de crecimiento (Desarrollo vegetativo) hasta que el cultivo alcance los 20 – 25 cm de altura (2-8 hojas), posteriormente la aplicación debe ser dirigida a las malezas. Se recomienda además que las malezas a controlar se encuentren en los primeros estados fenológicos, es decir cuando tengan alrededor de 3 – 4 hojas verdaderas. Realizar un máximo de una aplicación por campaña/año. El gasto máximo de agua/Hectárea es 540 litros.

En caña se recomienda aplicar el producto durante el desarrollo vegetativo del cultivo y cuando las malezas se encuentren en activo crecimiento cuando tengan alrededor de 3 – 4 hojas verdaderas. Realizar un máximo de una aplicación por campaña/año. El gasto máximo de agua/Hectárea es 400 litros.

En arroz se recomienda aplicar el producto durante el desarrollo vegetativo y cuando las malezas se encuentren en activo crecimiento (desarrollo de hojas). Realizar como máximo una aplicación por campaña/año. El gasto máximo de agua/Hectárea es 200 litros.

PERÍODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Este producto es incompatible con agentes altamente oxidantes.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico usado a las dosis recomendadas y en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase concuerdan con la descripción indicada en la etiqueta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



15.5 cm