

18.0 cm

DK-ZEB 80 PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA

• Ingrediente activo:

Mancozeb..... 800 g/kg

• Aditivos 200 g/kg

Reg. PQUA N° 011 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar
Telf.: 501-1000 / Fax: 262-8403

FABRICADO Y FORMULADO POR:
ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD.
Sofia 1000, Solunska Str. 58 B, FL. 1
Apt. 1. Bulgaria.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 500 gramos

Número de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

17.0 cm

**“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ESTE PRODUCTO NO PUEDE SER USADO POR PERSONAS QUE MANTENGAN TRATAMIENTO PARA EPILEPSIA, ESPECIALMENTE CON FENOBARBITAL
- "El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas"
- "Causa irritación moderada a los ojos"
- "Evite contacto con la piel y la ropa"
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ditiocarbamato
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a:
CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD Telf.: 423-7600
- NOTA AL MÉDICO: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

MANEJO DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

*Peligroso para los peces, no contamine fuentes de agua con los

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/Ha	Kg/200 L		
Tomate	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.5 - 0.7	5	5
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	-	0.75	ND	0.1
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	2.5 - 3.0	-	ND	0.1
Papa	Hielo o Ranchar	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0 - 1.2	0.5 - 0.6	14	0.1
Holantao	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.5 - 0.6	ND	ND

LMR: Límite máximo de residuos

La dosis mínima corresponde a aplicaciones preventivas en plantas tiernas. En plantas desarrolladas y cuando la presión de la enfermedad es alta, usar las dosis altas.

PC: Período de carencia

ND: No determinado

restos de la aplicación o sobrantes y envases vacíos del producto"

"Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre"

"En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DK ZEB 80 PM, es un fungicida a base de Mancozeb usado para prevenir el ataque de *Botrytis cinerea* en el cultivo de tomate, *Cercospora asparagi* en el cultivo de espárrago.

Actúa por contacto, inhibiendo los grupos sulfhídricos (SH) de los aminoácidos, proteínas y enzimas de las células de los patógenos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

DK ZEB 80 PM, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual o a motor.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones / campaña / año, en periodos de 7-14 días, dependiendo de las condiciones climáticas y del estado fenológico del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD

DK ZEB 80 PM, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

