



**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA**


**Concentrado Soluble (SL)**

**COMPOSICIÓN:**  
 Acido Giberelico..... 40 g/L  
 Alcohol isopropilico..... 758 g/L

Reg. RCP N° 228 – SENASA

**NO CORROSIVO      NO EXPLOSIVO**  
**NO INFLAMABLE**

Formula empírica: C<sub>20</sub>H<sub>30</sub>O<sub>5</sub>  
 Peso molecular: 346,38  
 Formula estructural:



**Propiedades Físicas y químicas del producto formulado**

Estado: Líquido  
 Color: Blanco  
 Punto de fusión: 223-225° C  
 Punto de inflamación: Inflamable  
 Estabilidad: 2 años mínimo

Titular de Registro, Formulador y Distribuidor:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702.  
 Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú  
 Telf.: (01) 253-6444  
 atencionalcliente@grupoandina.com.pe

**LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aguas para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- Si el contacto fuese por la piel lávese con abundante agua limpia y jabón por 15 minutos.

!Nota al médico: Tratamiento sintomático si aparece diarrea. No se recomienda el lavado gástrico a menos que se haya ingerido grandes cantidades.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIAS**  
 SAMU: 105  
 CAISAC: 01-253-6444  
 CICOTOX (01) 328-7700

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**PRECAUCIÓN**



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

RIVAL® es un regulador de crecimiento de plantas que favorece el rendimiento del cultivo.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y APLICACIÓN**

RIVAL® se emplea diluido en agua; preparar una mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

RIVAL® puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda un máximo de tres aplicaciones por campaña con frecuencia de 15 días entre aplicaciones. Considerar 1 campaña por año.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

RIVAL® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Sin embargo se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

**FITOTOXICIDAD**

RIVAL® no es fitotóxico a la dosis y usos recomendados en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	Momento de aplicación	Dosis ml/200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
ALCACHOFA	La aplicación deberá realizarse durante el desarrollo vegetativo (60,75 y 90 días).	125	7	5
ALFALFA	Crecimiento vegetativo.	50	N.A.	5
CEBOLLA	La aplicación deberá ser foliar cuando el cultivo tenga 40 días después de realizado el trasplante.	25 - 50	15	5
PAPA	Brotamiento del tubérculo.	25	N.A.	5
VID	La aplicación debiera realizarse en: 1° Bayas de 9-12 mm de diámetro. 2° Bayas de 14-16 mm de diámetro. 3° Bayas de 18-20 mm de diámetro.	150	14	5

P.C: Periodo de carencia      LMR: Límite Máximo de Residuos      N.A: No aplica