20,00 cm

14,00 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con
abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
No re-envasar o depositar el contenido en otros envases.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrale la etiqueta.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese por la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
En caso de ingestión accidental del producto, provoque vómitos hasta que arroje la mayor cantidad posible del veneno que tiene en el estómago.
En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos.
CICOTOX: 328-7398 Antalien SAC 445-7352
No dar de beber nada a un paciente que se encuentre incosciente.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, finalmente destruyalo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática altas.

# Sinofenuron® 50 EC

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

**CONCENTRADO EMULSIONABLE – EC**

**Composición Química:**
Lufenuron…….....50 g/L
Aditivos…….....c.s.p 1L

**Registro PQUA Nº 902 - SENASA**

**Titular del Registro: ANTALIEN SAC**

**Formulado por:**
SINOCHEM NINGBO LTD.
21 JiangXia St.,Ningbo China. Zip Code: 315000

**Importado y distribuido por:**
ANTALIEN SAC
Calle Arica Nro. 125 Oficina. 401 – Miraflores - Lima
Teléfono: (01) 445-7352

Nº Lote:
F. de Form:
F. de Venc:
Contenido neto: **10 L**

Antalien
Calidad para la Agricultura

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO** **NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SINOFENURON 50 EC** es un insecticida inhibidor de la síntesis de quitina, que actúa mayormente por ingestion, las larvas son incapacitadas de muda, y también dejan de alimentarse.

**SINOFENURON 50 EC** será usado para el control de *Copitarsia corruda* en el cultivo de espárrago.

**SINOFENURON 50 EC** se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

**Forma de preparar la suspensión**
Verter la dosis a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar ésta al volumen de agua.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

| Cultivo | Plaga | | Dosis | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | | | |
| Espárrago | Comedor de hoja | *Copitarsia corruda* | 0,2 L/ha | 7 | 0,02 |

**PC:** Período de carencia / **LMR:** Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** El número máximo de aplicaciones debe ser de 2 aplicaciones/campaña. El momento de aplicación es cuando se empiece a registrar la presencia de la plaga (brotación) y/o cuando se empiece a observar los primeros síntomas de raspado de tallos.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se puede ingresar al área tratada después de 12 horas.

**COMPATIBILIDAD:**SINOFENURON 50 EC es compatible con la mayoría de los plaguicidas, sin embargo es recomendable siempre antes de hacer una mezcla comprobar la compatibilidad física.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**