LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

PRIMEROS AUXILIOS

Nimbiol 0.1% CE no es tóxico por vía oral y dermal, sin embargo siendo una sustancia de origen orgánico se recomienda en caso de ingestión inducir al vómito y consultar al médico. Así mismo se recomienda remover a la persona del área contaminada, retirar ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón

Antídoto. Nota al médica

-Teléfonos de Emergencia

CICOTOX: 0-800-13040 (gratuito)
ESSALUD EN LINEA: 0-801-10200 (gratuito) 411-8000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD
TRIPLE LAVADO
AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
-No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
-No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
-Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Nimbiol®
0.1% CE

Extracto Vegetal

INSECTICIDA - FUNGICIDA - AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Ingrediente activo:
Aceite de Neem.....99.90 %
Azadirachtina.....0.10 %

Reg. PBUA Nº 113 SENASA

Titular del Registro:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia
II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono 348-1018 - 349-9609

Formulado por:
Fortune Biotech Ltd.
6-6-125 Annam gardens, Kavdiguda
Secunderabad - 500 380, A.P. India
Tel. 2753 4867, 2753 1888

Importado y distribuido por:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia
II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono 348-1018 - 349-9609

Contenido Neto: **200 L**
Fecha de Formulación
N° de Lote:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Nimbiol 0.1 % CE es un insecticida y fungicida biológico extraído de las semillas del árbol tropical del Neem *Azaridachta indica*; está compuesto por una mezcla de más de 100 terpenoides, el más activo es la azaridactina.

Nimbiol 0.1 % CE como insecticida actúa por contacto, es letal para huevos y ninfas de *Bemisia tabaci*, actúa como un inhibidor de la alimentación y tiene acción repelente.
Como fungicida actúa de manera preventiva y curativa a inicios de la infestación.

En almacén, conserve a temperaturas mayores a 15°C, evite mantener stocks en lugares frios.

Sistemas de preparación y aplicación:
Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad del tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS L/cil (200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Tomate	Mosca blanca	*Bemisia tabaci*	*1.5	NA	NA
Café	Roya del café	*Hemileia vastatrix*	0.5 - 1	NA	NA
Vid	Oidium	*Uncinula peruviana*	0.5 - 1	NA	NA
Mandarina	Minador de la hoja	*Phyllocnistis citrella*	1	NA	NA

* Volumen de gasto de agua: 400 L/ha, L.M.R: Límite Máximo de Residuos, (ppm): Partes por millón
P.C.: Periodo de Carencia, NA: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar al inicio de la infestación de la plaga, la frecuencia será de acuerdo a las recomendaciones del asesor técnico. No aplicar en la presencia de lluvias o con temperaturas altas. Es mejor realizar las aplicaciones por las tardes. Guardar el producto en un lugar fresco y seco. Evitar la exposición directa al sol y a altas temperaturas.

PERIODO DE REINGRESO
No ingrese a las áreas tratadas durante una hora después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
Nimbiol 0.1 % CE es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. No se recomienda usar con Azufre ni Cobre. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad física antes de mezclar con diferentes productos.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico a la dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL.- El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCIÓN

MARCA NIMBIOL 0.1% EC
PANTONE WARM RED C

LOGO POINT ANDINA S.A.
PANTONE 356 C

BANDA TOXICOLÓGICA
PANTONE 355 C