

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**  
**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Nimbiol 0.1% CE no es tóxico vía oral y dermal, sin embargo siendo una sustancia de origen orgánica se recomienda en caso de ingestión inducir al vómito y consultar al médico. Así mismo se recomienda remover a la persona del área contaminada, retirar ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.

Antídoto, Nota al médico:

- Teléfonos de Emergencias.

**CICOTOX: 328 7700**

**ESSALUD: 411 8000 opción 4**

**CISPROQUIM: 0800 50847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositar en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Nimbiol®

0.1% CE

## Extracto Vegetal

**INSECTICIDA - FUNGICIDA - AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**COMPOSICIÓN:**

Ingrediente activo:

Aceite de Neem.....99.90 %  
 Azadirachtina.....0.10 %

**Reg. PBUA N° 113 SENASA**

**Titular de Registro, Importado Y**

**Distribuido por:**


**POINT ANDINA S.A**

Calle Loreto 304

Urb. Sta Patricia, II tapa

La Molina, Lima - Perú

Teléfono 348-1018/349-9609



**Point**  
 ENTREGAMOS  
 CALIDAD

Contenido Neto: **200 L**

Fecha de Formulación

N° de Lote:

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Nimbiol 0.1% CE** es un insecticida y fungicida biológico extraído de las semillas del árbol tropical del Neem *Azadirachta indica*; está compuesto por una mezcla de más de 100 terpenoides, el más activo es la azadirachtina.

**Nimbiol 0.1 % CE** como insecticida actúa por contacto, es letal para huevos y ninfas de *Bemisia tabaci*, actúa como un inhibidor de la alimentación y tiene acción repelente.

Como fungicida actúa de manera preventiva y curativa a inicios de la infestación.

En almacén, conserve a temperaturas mayores a 15°C, evite mantener stocks en lugares fríos.

Sistemas de preparación y aplicación:

Para una adecuada aplicación, llenar hasta la mitad del tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/cil (200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.5 - 1	NA	NA
Mandarina	Minador de la hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	1	NA	NA
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	*1.5	NA	NA
Vid	Oidium	<i>Uncinula peruviana</i>	0.5 - 1	NA	NA

\* Volumen de gasto de agua: 400 L/ha, L.M.R: Limite Máximo de Residuos, (partes por millón)  
 P.C.: Periodo de Carencia. NA: No aplica.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar al inicio de la infestación de la plaga, la frecuencia será de acuerdo a las recomendaciones del asesor técnico. No aplicar en la presencia de lluvias o con temperaturas altas. Es mejor realizar las aplicaciones por las tardes. Guardar el producto en un lugar fresco y seco. Evitar la exposición directa al sol y a altas temperaturas.

**PERIODO DE REINGRESO** No ingresar a las áreas tratadas durante una hora después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD NIMBIOL 0.1 % CE** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. No se recomienda usar con azufre ni cobre. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad física antes de mezclar con diferentes productos.

**FITOTOXICIDAD** No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



**PRECAUCIÓN**

