

# PROYECTO DE ETIQUETA – MYCLOTHANE – PRESENTACIÓN DE 250 g (Formulado en China)

# MYCLOTHANE

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

## COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Myclobutanil..... 400 g/kg  
Aditivos .....C.S.p..... 1 kg

Reg. N°

**Titular del Registro:**  
**FARMEX S.A.**

Fabricado y formulado por:  
**JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.**  
No. 309, Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industrial Park,  
Nanjing, China 2100047.



Importado y Distribuido por:

**FARMEX S.A.**

Calle Dean Valdivia 148, Piso 7, San Isidro, Lima-27, Perú.  
Teléfono: (01)630-6400, Fax: (01)630-6410.

N° de Lote :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :  
Contenido Neto : 250 gramos

**NO  
CORROSIVO**

**NO  
INFLAMABLE**

**NO  
EXPLOSIVO**

## LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto puede ser mortal si se ingiere. Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazoles
- Teléfonos de Emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de ESSALUD: 117 (línea gratuita), CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita) ó (01)328-7398, Farmex S.A.: (01) 630-6400.
- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vómito, especialmente si el paciente está inconsciente.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, efectuar una limpieza con bastante agua, aplicada en los ojos en forma de chorro durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

### NOTA AL MÉDICO

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y dépositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

### CUADRO DE USOS Y DOSIS:

| Cultivo                                                   | Enfermedad      |                           | Dosis   |         | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                                           | Nombre<br>común | Nombre<br>científico      | g/Ha    | g/cil   |              |              |
| Alcachofa                                                 | Oidiois         | <i>Leveillula taurica</i> | -       | 100-150 | 3            | 0.5          |
| <i>Capsicum annuum</i><br>(pimientos, p  prika, piquillo) | Oidiois         | <i>Leveillula taurica</i> | -       | 100-150 | 3            | 0.5          |
| Vid                                                       | Oidiois         | <i>Erysiphe necator</i>   | 200-300 | -       | 14           | 1            |

PC: Per  odo de Caren  a. LMR: L  mite M  ximo de Residuos.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MYCLOTHANE es un fungicida sist  mico, r  pidamente absorbido por el follaje y trasladado v   xilema, y que posee acci  n preventiva, curativa y erradicante. Es un fungicida perteneciente al grupo de los triazoles, que act  a interfiriendo e inhibiendo la s  ntesis del ergosterol, componente fundamental de las paredes celulares de los hongos que controla.

### SISTEMA DE PREPARACI  N Y APLICACI  N

MYCLOTHANE se aplica en pulverizaci  n empleando equipos de aspersi  n manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparaci  n de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicaci  n con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

### FRECUENCIA Y N  MERO DE APLICACIONES

No realizar m  s de 2 aplicaciones/campa  a/a  o. El intervalo de aplicaci  n es 15 d  as o m  s.

### PER  ODO DE REINGRESO

No reingresar sin protecci  n a un campo aplicado hasta 24 horas despu  s de la aplicaci  n. Mantener alejado al ganado durante este periodo.

### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayor  a de los plaguicidas com  nmente usados a excepci  n de los de reacci  n alcalina, azufres y cobres. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezcl  ndolos en su debida proporci  n en un envase peque  o.

### FITOTOXICIDAD

MYCLOTHANE no ha mostrado s  ntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las caracter  sticas f  sico qu  micas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqu   recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

