

PROYECTO DE ETIQUETA – MYCLOTHANE – PRESENTACIÓN DE 250 g (Formulado en Perú)

MYCLOTHANE

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Myclobutanil..... 400 g/kg
AditivosC.S.p..... 1 kg

Reg. N°

Titular del Registro:
FARMEX S.A.

Fabricado por:
JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
No. 309, Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industrial Park,
Nanjing, China 2100047.



Formulado y Distribuido por:

FARMEX S.A.

Calle Dean Valdivia 148, Piso 7, San Isidro, Lima-27, Perú.
Teléfono: (01)630-6400, Fax: (01)630-6410.

N° de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :
Contenido Neto : 250 gramos

**NO
CORROSIVO**

**NO
INFLAMABLE**

**NO
EXPLOSIVO**

LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto puede ser mortal si se ingiere. Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazoles
- Teléfonos de Emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de ESSALUD: 117 (línea gratuita), CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita) ó (01)328-7398, Farmex S.A.: (01) 630-6400.
- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vómito, especialmente si el paciente está inconsciente.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, efectuar una limpieza con bastante agua, aplicada en los ojos en forma de chorro durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

NOTA AL MÉDICO

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y dépositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS:

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/Ha	g/cil		
Alcachofa	Oidio	<i>Leveillula taurica</i>	-	100-150	3	0.5
<i>Capsicum annuum</i> (pimientos, pprika, piquillo)	Oidio	<i>Leveillula taurica</i>	-	100-150	3	0.5
Vid	Oidio	<i>Erysiphe necator</i>	200-300	-	14	1

PC: Perodo de Carena. LMR: Lmite Mximo de Residuos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MYCLOTHANE es un fungicida sistmico, rpidamente absorbido por el follaje y trasladado va xilema, y que posee acci preventiva, curativa y erradicante. Es un fungicida perteneciente al grupo de los triazoles, que acta interfiriendo e inhibiendo la sntesis del ergosterol, componente fundamental de las paredes celulares de los hongos que controla.

SISTEMA DE PREPARACIN Y APLICACIN

MYCLOTHANE se aplica en pulverizacin empleando equipos de aspersin manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparacin de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicacin con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

FRECUENCIA Y NMERO DE APLICACIONES

No realizar ms de 2 aplicaciones/campaa/ao. El intervalo de aplicacin es 15 das o ms.

PERODO DE REINGRESO

No reingresar sin proteccin a un campo aplicado hasta 24 horas despus de la aplicacin. Mantener alejado al ganado durante este periodo.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayora de los plaguicidas comnmente usados a excepcin de los de reaccin alcalina, azufres y cobres. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclndolos en su debida proporcin en un envase pequeo.

FITOTOXICIDAD

MYCLOTHANE no ha mostrado sntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las caractersticas fsico qumicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqu recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

