



ARTE

BAMECTIN - NOVA CROP PROTECTION CO., LTD  
(Etiqueta 20L, 25L, 200L)

Revisión: 03  
Aprobado: CC/MKT/JN  
Fecha: 13-10-2023  
Página: 4 de 4

48,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo Químico: Lactona Macroclíctica.**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
SAMU: 106 SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

# Bamectin®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA-ACARICIDA-NEMATICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:  
Abamectina : 18 g/L  
Aditivos : c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 965 - SENASA



**Titular del Registro:**  
SILVESTRE PERÚ S.A.C.  
Calle Arica 242 Miraflores.  
Lima 18 - Perú.  
Tel.: (01) 617-3300

**Contenido Neto:**  
N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

**Importado y Distribuido por:**  
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

**Formulado por:**  
NOVA CROP PROTECTION CO., LTD,  
8 South Liyuan Road, Jiangning District,  
Nanjing, China.



INFLAMABLE



NO CORROSIVO



EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

BAMECTIN® es un insecticida-acaricida utilizado para el control de las plagas que se indica en el cuadro de usos. BAMECTIN® actúa por contacto e ingestión, además tiene acción translaminar en la planta. BAMECTIN® se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada en un balde con un tercio del volumen de agua, luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua. BAMECTIN® puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca, atomizador a motor, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200L	L/ha		
ALCACHOFA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	150	-	7	0.01
	Amauromyza	<i>Amauromyza maculosa</i>	200 - 400	-	7	
CEBOLLA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	250	-	21	0.01
ESPÁRRAGO	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	150 - 200	-	7	0.01
FRESA	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	100 - 120	-	7	0.02
HOLANTAO	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	200 - 300	-	3	0.01
LIMÓN	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	150 - 200	-	7	0.015
	Minador de la hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	80 - 100	-	7	
MANDARINA	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	125	-	7	0.01
	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	150 - 300	-	7	
PALTO	Arañita roja	<i>Oligonychus yothersi</i>	100 - 150	-	3	0.01
PAPA	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	70 - 100	-	7	0.01
	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	200	-	7	
PÁPRIKA	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	100	-	7	0.05
PIMIENTO	Nemátodo del nódulo de la raíz	<i>Meloidogyne incognita</i>	-	4	7	0.07
PITAHAYA	Nemátodo formador de nódulos	<i>Meloidogyne spp.</i>	-	4-6	4	0.01
VID	Acaro de la yema	<i>Colomerus vitis</i>	200	0.6	7	0.01
	Nemátodo del nódulo de la raíz	<i>Meloidogyne incognita</i>	-	4-6	14	
	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	100 - 200	-	4	

P.C.: Período de Carenia  
\*Regar un día antes de la aplicación.

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Número de aplicaciones por campaña: 2 a 3 aplicaciones por campaña. Se recomienda aplicar BAMECTIN® con una aplicación/campaña y gasto de agua de 400 a 800 L/ha para el cultivo de vid.

**PERÍODO DE REINGRESO:** Puede reingresar al campo 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD:** BAMECTIN® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



Medidas en cm

L. SILVESTRE  
T. LAVADO



PANTONE 343 C  
C 89 - M 19 - Y 72 - K 60

L. SILVESTRE  
HOJA



PANTONE 377 C  
C 50 - M 1 - Y 100 - K 20

L. BAMECTIN  
PICTOGRAMA



PANTONE 485 C

B. TOXICOLÓGICA



P. YELLOW C

T. LAVADO



PANTONE 293 C

TEXTO



P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de GRUPO SILVESTRE