INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SCOBER es un fungicida sistémico y de amplio espectro. Es absorbido por órganos vegetativos de la planta e inmediatamente distribuido. Tiene acción curativa.

SCOBER actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol, con lo cual impide la formación de la membrana celular del hongo, impidiendo de esta manera el crecimiento y desarrollo del hongo.

SCOBER se aplica en forma de aspersión foliar. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto a la dosis indicada revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado, agitando hasta obtener una mezcla homogénea

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L / 200L	L/ha		
Alcachofa	"Oidium"	*Leveillula taurica*	0.1	-	7	1.5
Arroz	"Pyricularia"	*Pyricularia oryzae*	0.2	0.2	30	8
Cebolla	"Mancha del peral"	*Stemphylium vesicarium*	0.2	-	7	0.1
Vid	"Oidium"	*Erysiphe necator*	0.1	0.3	14	3
Pimiento	"Oidium"	*Leveillula taurica*	0.1	-	7	0.6

PC: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar SCOBER (difenoconazole) máximo 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año en los cultivos de alcachofa, arroz, cebolla, vid y pimiento. Para el cultivo de arroz considerar un gasto máximo de agua de 200 L/Ha. Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

SCOBER es compatible con los agroquímicos de reacción neutra y adyuvantes más comúnmente usados. Es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Scober

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Difenoconazole.....250 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 969 - SENASA

Grupo Químico: Triazoles
Nombre Químico (IUPAC): Cis, trans-3-chloro-4-(4-chloro-2(1H-[1,2,4 triazole-1-ylmethyl)-1,3-dioxalan-2-yl)phenyl-4-chlrophenyl ether
Fórmula empírica: $C_{19}H_{17}Cl_2N_3O_3$
Peso molecular: 406.3 g/mol

Fórmula estructural:



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	:Líquido
Color	:Amarillo
Olor	:Característico
pH	:5-8
Densidad	:1.05 g/cm^3

Titular del Registro:
Sociedad Anónima Fausto Piaggio

Formulado por:
ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT AND EXPORT CORPORATION
No. 37 Qing Chun Road, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China.

Importado y distribuido por:
SOCIEDAD ANONIMA Fausto Piaggio
Av. Guillermo Dansey 2045
Cercado de Lima, Perú
Telf: 464-2222
e-mail: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471

DIVISIÓN AGRÍCOLA
Piaggio
EL GRAN AMIGO DEL AGRICULTOR

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO."
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar el producto en lugares frescos secos y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Triazoles

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa adjunta, no deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos por 20 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de Inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte.
- Antídoto: No tiene antídoto especifico.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS:
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
Sociedad Anónima Fausto Piaggio: (01) 464-2222

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico paro organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.