8 cm

12 cm

# Amistrobin

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**

**Composición:**

Azoxystrobin.....500 g/kg

Aditivos.....c.s.p.1 kg

**Reg. PQUA N° 622 - SENASA**

Titular de registro:
**SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO**

Formulado por:
**ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT AND EXPORT CORPORATION**
No. 37 Qing Chun Road, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China.

Importado y distribuido por:
**CIPAGRO S.A.C**
Calle Las Castañitas N° 138
Urbanización El Palomar San Isidro
Teléfono: 464 9700
e-mail:ventas@cipagro.com.pe
RUC:20601693993

CIPAGRO S.A.C.
CIENCIA PARA EL AGRO

**Contenido Neto: 40 g**

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

8 cm

12 cm

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**"Manténgase bajo llave, fuera del alcance de los niños"**

**"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas"**

**"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta"**

**En caso de emergencia llamar a los teléfonos:**
**ESSALUD EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)**
**CETOX: 080071911 (Linea gratuita)**
**CISPROQUIM: 0800-50847**
**CICOTOX 0800-13-040**

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**
**CUADRO DE DOSIS Y USOS**

| CULTIVO | ENFERMEDAD | | DOSIS | | Periodo de carencia* (días) | LMR** (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | g/cil 200 L | g/ha | | |
| Alcachofa | Oidium | *Leveillula taurica* | 60 | - | 0 | 5 |
| Espárrago | Mancha púrpura | *Stemphylium vesicarium* | 80 | 200 | 7 | 0.01 |
| Fresa | Podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 100 | - | 0 | 10 |
| Mandarina | Mancha negra de la hoja | *Alternaria alternata* | 40-45 | - | 0 | 15 |
| Palto | Botrytis | *Botrytis cinerea* | 40-55 | 150-200 | 0 | 0.05 |
| Papa | Tizon temprano | *Alternaria solani* | 80 | - | 7 | 7 |
| Vid | Oidium | *Erysiphe necator* | 50 | 200 | 14 | 2 |
| | Moho gris | *Botrytis cinerea* | 40-60 | 142-225 | 14 | 2 |

*Última aplicación antes de la cosecha **Límite máximo de residuos (ppm) n.d.: no determinado

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase concuerdan con la descripción indicada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.