

SIZE: 14.0 X 28.0 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es un irritante leve a la piel, por lo que se recomienda evitar la exposición usando equipos de protección como camisas de manga larga y pantalones largos y botas impermeables de caña alta. No es irritante a los ojos pero se recomienda usar caretas y gafas.
 - Usar guantes y delantales impermeables durante la preparación de la solución fungicida.
 - No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
 - Después de usar el producto retire la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Finalmente vístase con ropa limpia.
 - Lave la ropa contaminada usando guantes de goma. Almacene y lave la ropa contaminada por separado y no con la ropa familiar o de otro uso.
 - Utilice equipo de protección si es necesario ingresar al campo antes de transcurrido el período de reingreso.
 - No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Azoles
 - En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. No provoque el vómito.
 - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca al menos por 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarlos con abundante agua y jabón. Llevar al paciente al médico.
 - En caso de inhalación retire a la persona del área contaminada hacia una zona de aire fresco; si la respiración es irregular dar respiración artificial. Llevar al paciente al médico.
 - Este producto no tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.
 - En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas) ó
ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 ó CISPROMQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase, inutilicelo y entregue el envase al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



DIFENOVA 250 EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Difenoconazole.....250 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 636 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

ESDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA
Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú.
Teléfono: (044) 28 - 9877, Nextel: 831*5780
info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:

JINAN FUSEN BIO-CHEMICALS CO. LTD
403, N° 1728, Second Ring east Road, Jinan City, Shangdong, China
Telf: 086-531-58897128

IMPORTADOR:

AGRYNOVA SAC
Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú.
Teléfono: (044) 28 - 9877, Nextel: 831*5780.
info@agrynova.com, www.agrynova.com



Fecha de Formulación:
N° de Lote :
Contenido Neto : 1 L
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

DIFENOVA 250 EC es un fungicida sistémico y curativo.

Para la preparación de la mezcla y aplicación:

- Agitar el contenido del producto en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia.
- Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado.
- La aplicación puede ser realizada por diversos equipos de aplicación como mochila de palanca, moto pulverizadoras, pulverizadoras neumáticas accionadas por tractor entre otras.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO Y DOSIS:

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/Ha		
Espárrago	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.15 - 0.20	0.30 - 0.50	7	0.3

PC: Período de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar hasta dos veces por campaña. Se puede aplicar en cualquier estado de desarrollo del cultivo y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al área tratada antes de las 12 horas.

COMPATIBILIDAD:

No es compatible con los siguientes productos propiconazole, fludioxonil, carbendazim, fludioxonil, metalaxil y tebuconazole. Realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No se observan efectos de fitotoxicidad de seguirse las recomendaciones incluidas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

