**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo durante la preparación de la mezcla de aplicación.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

**PRIMEROS AUXILIOS.**

- Grupo químico: Avermectinas
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:
**CICOTOX Telf. : 0800-1-3040 (Atención 24 horas)**
**ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4**
**FITOCORP SAC: 016522182**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

Después de usar el contenido inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces, no contaminar, lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# EMACTIN 5 % SG

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

### Gránulos solubles - SG

**COMPOSICION:**

Emamectin benzoato..... 50 g/Kg
Aditivos..... c.s.p 1 Kg

Registro PQUA N° 971 - SENASA

Titular del registro:
**FITOCORP SAC**
Jr. Las Poncianas N° 147 Interior 2 B
Urb. La Molina vieja. La Molina - Lima
Teléfono: 016522182

Formulado por:
**BETA CHEMICALS**
Rm.707, Blk. A, Kingsound Center, No. 116 Zizhuyuan Road,
Beijing 100097, China

Importador y distribuidor:

Contenido Neto: 1 kg
Lote Nro:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua aplicar, empezar agitar y simultáneamente echar la cantidad de EMACTIN 5 % SG, a utilizar agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente complementar la cantidad de agua.
- EMACTIN 5% SG, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.
- Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

| Cultivo | Plaga | | Dosis | | PC (Días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | Kg/200L | Kg/Ha | | |
| Pimiento | Gusano Perforador Del Fruto | *Heliothis virescens* | 0.09 - 0.10 | | 3 | 0.01 |
| Espárrago | Gusano perforador del fruto | *Heliothis virescens* | | 0.175 | 7 | 0.01 |
| Palto | Bicho del cesto | *Oiketicus kirbyi* | 0.08 | | 28 | 0.01 |
| Maíz | Cogollero | *Spodoptera frugiperda* | 0.175 | | 7 | 0.01 |

PC: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuo (partes por millón).

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Puede ser aplicado hasta 2 veces por campaña y se debe aplicar cuando el lepidóptero se encuentre en sus primeros estadios larvales de desarrollo. Para evitar la aparición de resistencia, se recomienda no aplicar EMACTIN 5 % SG de manera consecutiva, rotándolo siempre con productos de diferente modo de acción.

**PERIODO DE REINGRESO**

- No reingresar al área tratada antes de las 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

- Compatible con la mayoría de plaguicidas; sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

- No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

- El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**