

30.0 cm

2.0 cm

**" LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo durante la preparación de la mezcla de aplicación.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después, de usar este producto bájese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminado.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

**PRIMEROS AUXILIOS.**

- Grupo químico: Avermectina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

**CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)**

**ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4**

**FITOCORP SAC: 016522182**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido inútilcelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces, no contaminar, lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las



# EMACTIN 5% SG®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Gránulos solubles SG**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Emamectin benzoato..... 50 g/Kg

Aditivos..... c.s.p 1 Kg

**Registro PQUA N° 971 - SENASA**

Titular del Registro:

**FITOCORP SAC**

Jr. Las Poncianas N° 147. Urb. La Molina Vieja. La Molina – Lima  
Teléfono: 016522182

Formulador:

**BETA CHEMICALS**

Rm.707, Blik. A, Kingsound Center, No. 116 Zizhuyuan Road, Beijing 100097, China

Importado y Distribuido por:



Contenido Neto: 1 Kg

Lote N°:

Fecha de Producción:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua aplicar, empezar agitar y simultáneamente echar la cantidad de **EMACTIN 5% SG**, a utilizar agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente complementar la cantidad de agua.

**EMACTIN 5% SG**, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.

Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivos	Plaga		Dosis		PC (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200 L	Kg/Ha		
<b>Pimiento</b>	Gusano Perforador del Fruto	<i>Heliothis virescens</i>	0.09 - 0.100		3	0.01
<b>Espárrago</b>	Gusano Perforador del Fruto	<i>Heliothis virescens</i>		0.175	7	0.01
<b>Palto</b>	Bicho del Cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.08		28	0.01
<b>Maíz</b>	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.175		7	0.01
<b>Arándano</b>	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.08 - 0.09		7	0.01

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

Puede ser aplicado hasta 2 veces por campaña y se debe aplicar cuando el lepidóptero se encuentre en sus primeros estadios larvales de desarrollo. Para evitar la aparición de resistencia, se recomienda no aplicar **EMACTIN 5% SG** de manera consecutiva, rotándolo siempre con productos de diferente modo de acción.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al área tratada, después, de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

Compatible con la mayoría de plaguicidas; sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

15.0 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

