

1.0 ± 0.2

20.7 ± 0.3 cm

0.9 ± 0.2

7.7 ± 0.3 cm

1.2 cm

LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerrado, en un lugar fresco, alejado del calor y bajo llave.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Inidazol
- Teléfono de Emergencia:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEOAGRUM SAC: 817-4400
CISPROQUIM: 0800-50-347 ALOESSALUD: 0801-10200 (gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y depóstele en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

COMPOSICIÓN:

Picbhozaz: 450 g/L

Aditivos: c.s.p. 1L

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Reg. PQUA N° 881 - SENASA

Titular del Registro, importado y distribuido por:

NEOAGRUM S.A.C.

Calle Centurias 270 Cl. 1001 - Miraflores - Lima

Teléfono: 817-4400 / Fax: 817-4401

Contenido neto: 250 mL

N° de Lot.:
F. de Lab.: "Ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:
HANGZOU CHANGSE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
84 Riverside Wharf Road, Changshu Town,
Hangzhou, Zhejiang Province - China

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

NIAGARA
45 CE

FUNGICIDA AGRÍCOLA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NIAGARA® 45 CE es un fungicida sistémico, de acción preventiva y curativa. NIAGARA® 45 CE es absorbido por hojas y tallos, verdes dependiendo de las condiciones climáticas y del desarrollo del cultivo. El sentido de translocación es acropeto (hacia las puntas), aprovechando la corriente xilemática.

NIAGARA® 45 CE se prepara diluyendo la dosis en un poco de agua, luego se vierte esta solución al tanque de preparación, se agita y se completa con agua hasta el volumen deseado. Aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/ha		
Falso	Muñita regresiva	Isosulfocida	0,1	-	5	5
Tonale	Tizón temprano	Alternaria solani	0,07-0,15	0,14-0,225	14	0,05

P.C.: Periodo de curación L.M.R.: Límite máximo de residuo

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO