

# Aspire®

120 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Spinosad ..... 120 g/L  
Aditivos.....c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° 973 - SENASA


**Grupo Químico:** Espinosinas (Lactona macrocíclica)

**Nombre Químico:** Mezcla de spinosyn A + spinosyn D


**Formula Empírica:** C<sub>41</sub>H<sub>65</sub>NO<sub>10</sub> (spinosyn A) + C<sub>42</sub>H<sub>67</sub>NO<sub>10</sub> (spinosyn D)

**Peso Molecular:** 731.98+745.98 g/mol

**Formula Estructural:**



Spinosyn A



Spinosyn D

NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

Estado físico : Líquido viscoso

Color : Blanquecino

Olor : Un poco rancio

pH : 7.7

Densidad : 1.03 g/ml

Inflamabilidad : No inflamable

Explosividad : No explosivo

Corrosividad : No corrosivo

Estabilidad : Estable por dos años en el envase original a temperatura ambiente.

**PRESENTACIONES COMERCIALES:**

250 ml, 500 ml, 1 L, 4 L

**Titular del registro: POINT ANDINA S.A.**

**Importado y distribuido por:**

**POINT ANDINA S.A.**

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Teléfono +51 (01) 348 1018/ 349-9609

**Formulado por:**

**POINT AGRO-CHINA Ltd**

Wan Shi Town - Yixing, Jiangsu,

214217 China. Tel. (86-510)8785 1001



**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

• Grupo químico: Espinosinas (Lactona macrocíclica). • En caso de intoxicación/ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o la hoja informativa adjunta. • En caso de ingestión, enjuague la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito. • En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia durante 5 - 10 minutos. • En caso de contacto, quite la ropa y lave la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos. • En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario. • Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático. • En caso de emergencias llamar a:

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; POINT ANDINA S.A: (01) 348- 1018**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

• Tóxico para abejas u artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. • Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas. • Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. • Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas. • No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. • No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.

• Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. • En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

• Este producto es dañino por ingestión; no ingerir. • Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. • No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. • Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón. • Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes. • No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**ASPIRE 120 SC**, es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Pertenecer al grupo de las spinosinas y actúa sobre el sistema nervioso del insecto, sobre estimulando sus neuronas motoras, lo que causa temblores, falta de coordinación, parálisis y finalmente su muerte. **ASPIRE 120 SC** se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. No aplicar con temperaturas altas.

**CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN:**

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar previa evaluación de la plaga y de preferencia en las tardes. No aplicar en época de floración, por ser muy peligroso para abejas. De persistir la plaga usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia. En el cultivo de tomate se debe realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña, con un intervalo de 7 días entre aplicaciones. Para el cultivo de vid se recomienda 1 sola aplicación/campaña/año.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No ingresar al área tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**ASPIRE 120 SC** es compatible con la mayoría de los plaguicidas; en caso de duda, realizar una prueba de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS**

No tiene efecto sobre otros cultivos.

**EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES**

No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200L		
Tomate	Caballada (gusano ejército)	<i>Spodoptera eridania</i>	50 - 75	3	0.3
Vid	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	100	7	0.5

PC: Período de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

