

7.7 cm

0.7 cm

21.0 cm

0.5 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido este producto debe utilizarse para contener o transportar alimentos ni agua.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 08001 - 3040      CROP BUSINESS SAC: 349-2669  
CISPROQUIM: 328-7398      ESSALUD: 117

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los peces e invertebrados acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

# FUNGIKILL 250 EW

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW

**COMPOSICIÓN:**

Tebuconazole ..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 975 - SENASA  
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.  
Importado y distribuido por:  
CROP BUSINESS S.A.C.



Calle Toledo N° 161 Dpto. 201 Urbanización  
Mayorazgo IV Etapa - ATE - LIMA  
Teléfono: 349-2669

Contenido neto: 250 ml

N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

Formulado por:  
NANJING RHONQUIM CO., LTD  
26 Majia Street, Nanjing, Jiangsu, 210009  
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**  
FUNGIKILL 250 EW es un fungicida sistémico, que pertenece al grupo de los Triazoles, con acción protectante y curativa. Actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol produciendo el detenimiento del crecimiento y posterior muerte del hongo.  
Se aplica en pulverizaciones, previa mezcla en agua. Se recomienda llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar FUNGIKILL 250 EW, agitar continuamente y completar el resto del agua. Aplicar en forma de aspersión, con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado, según la dosis del cuadro adjunto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO   | PLAGA            |                        | Dosis      |         | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|------------------|------------------------|------------|---------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común     | Nombre Técnico         | lt/ 200 lt | lt/ha   |                |                 |
| Vid       | Oidium           | Erysiphe necator       | 0.06-0.1   | 0.3-0.5 | 21             | 2.0             |
| Espárrago | Cercosporiosis   | Cercospora asparagi    | 0.25       | 0.5     | 14             | 0.01            |
| Pimiento  | Oidium           | Leveillula taurica     | 0.2        | 0.6     | 7              | 0.5             |
| Papa      | Tizon temprano   | Alternaria solani      | 0.2        | 0.6     | 14             | 0.2             |
| Café      | Roya del café    | Hemileia vastatrix     | 0.25-0.3   | -       | 30             | 0.1             |
|           | Ojo de gallo     | Mycena citricolor      |            |         |                |                 |
| Arroz     | Pyricularia      | Pyricularia oryzae     | 0.2-0.4    | 0.2-0.4 | 35             | 2.0             |
| Cebolla   | Mancha del peral | Stemphylium vesicarium | 0.2-0.25   | 0.4-0.5 | 21             | 0.05            |

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar FUNGIKILL 250 EW al observarse los primeros síntomas de la enfermedad, con un máximo de 2 aplicaciones por cultivo/campaña. En el caso de vid, especialmente al brotamiento y en el espárrago a la apertura de los filodios, considerando en este cultivo un intervalo entre aplicaciones de 15 a 30 días.

**PERÍODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



1.20 cm