

15,50 cm

# Sinofenuron® 50 EC

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE – EC**

**Composición Química:**

Lufenuron.....50 g/L  
Aditivos.....c.s.p 1L

Registro PQUA Nº 902 - SENASA  
Titular del Registro: ANTALIEN SAC



**Importado y distribuido por:**  
ANTALIEN SAC  
Calle Arica Nro. 125 Oficina. 401 – Miraflores - Lima  
Teléfono: (01) 445-7352

Nº Lote: ..... Formulador por:  
F. de Form: ..... SINOCHEN NINGBO LTD.  
F. de Venc: ..... 21 JiangXia St., Ningbo China. Zip Code: 315000  
Contenido neto: 5 L

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.  
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.  
No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.  
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.  
No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.  
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.  
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese por la piel, lavarse con abundante agua y jabón.  
En caso de ingestión accidental del producto, provoque vómitos hasta que arroje la mayor cantidad posible del veneno que tiene en el estómago.  
En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos.

CICOTOX: 328-7398  
Antalien SAC 445-7352

No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, finalmente destruyalo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.  
Realizar obligatoriamente el triple lavado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.  
Peligroso para organismos acuáticos.  
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.  
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.  
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática altas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SINOFENURON 50 EC** es un insecticida inhibidor de la síntesis de quitina, que actúa mayormente por ingestión, las larvas son incapaces de muda, y también dejan de alimentarse.  
**SINOFENURON 50 EC** será usado para el control de *Copitarsia corruda* en el cultivo de espárrago.  
**SINOFENURON 50 EC** se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

**Forma de preparar la suspensión**

Verter la dosis a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar ésta al volumen de agua.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Comedor de hoja	<i>Copitarsia corruda</i>	0,2 L/ha	7	0,02

PC: Período de carencia / LMR: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

El número máximo de aplicaciones debe ser de 2 aplicaciones/campaña. El momento de aplicación es cuando se empiece a registrar la presencia de la plaga (brotación) y/o cuando se empiece a observar los primeros síntomas de raspado de tallos.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se puede ingresar al área tratada después de 12 horas.

**COMPATIBILIDAD:** SINOFENURON 50 EC es compatible con la mayoría de los plaguicidas, sin embargo es recomendable siempre antes de hacer una mezcla comprobar la compatibilidad física.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



15,00 cm

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

