

NUEVO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazol

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni dar nada por la boca si la persona se encuentra inconsciente. Lave la boca con abundante agua.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón al menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Si la respiración se dificulta, proporcionar respiración artificial.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua por lo menos durante 15 a 20 minutos. Remover lentes de contacto, si es posible. Buscar atención médica.

Nota al médico: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia:
CICOTOX: 0800-1-3040
CISPROQUIM: 0800-50847
Aló EsSalud: 472-2300 (emergencias 24 horas)

Tillot 250 EC®
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición: Propiconazole..... 250 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 977- SENASA
Titular de Registro:

QSI
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL
DEL PERU S.A.

Formulado por:
SHARDA CROPCHEM LIMITED
Domestic Road, 29th Road, Bandar (West)
Mumbai-400050, India.

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 250 mL
Fecha de Vencimiento:

Importado y Distribuido por:
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.
Av. República de Panamá 2577,
La Victoria, Lima-Perú
Telf.: 710-4000

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TILLOT®250 EC es un fungicida de amplio espectro que pertenece al grupo de los triazoles, de acción sistémica y buen poder residual.

TILLOT®250 EC es eficaz en el control preventivo y curativo.

TILLOT®250 EC se aplica por aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas, previa calibración del equipo. Llenar el tanque del equipo de aplicación a la mitad; preparar una pre-mezcla aparte e incorporarla al tanque de aplicación. Luego adicionar agua hasta completar el volumen requerido. Durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto mantener en marcha el sistema de agitación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS (L/ ctt 200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Quemado del arroz	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.15	36	7.0
Espárrago	Roya del espárrago	<i>Puccinia asparagi</i>	0.1	30	0.05
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.06	15	0.5

PC: Período de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar TILLOT®250 EC a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



NUEVO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazol

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni dar nada por la boca si la persona se encuentra inconsciente. Lave la boca con abundante agua.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón al menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Si la respiración se dificulta, proporcionar respiración artificial.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua por lo menos durante 15 a 20 minutos. Remover lentes de contacto, si es posible. Buscar atención médica.

Nota al médico: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia:
CICOTOX: 0800-1-3040
CISPROQUIM: 0800-50847
Aló EsSalud: 472-2300 (emergencias 24 horas)

Tillot 250 EC®
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición: Propiconazole..... 250 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 977- SENASA
Titular de Registro:
QSI
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL
DEL PERU S.A.

Formulado por:
NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.
N° 1165 Behai Road, Chemical Industry Zone 21 of Ningbo,
Chenhai District, Zhejiang, China

Importado y Distribuido por:
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.
Av. República de Panamá 2577,
La Victoria, Lima-Perú
Telf.: 710-4000

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 250 mL
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TILLOT®250 EC es un fungicida de amplio espectro que pertenece al grupo de los triazoles, de acción sistémica y buen poder residual.

TILLOT®250 EC es eficaz en el control preventivo y curativo.

TILLOT®250 EC se aplica por aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas, previa calibración del equipo. Llenar el tanque del equipo de aplicación a la mitad; preparar una pre-mezcla aparte e incorporarla al tanque de aplicación. Luego adicionar agua hasta completar el volumen requerido. Durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto mantener en marcha el sistema de agitación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS (L/ clt 200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Quemado del arroz	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.15	36	7.0
Espárrago	Roya del espárrago	<i>Puccinia asparagi</i>	0.1	30	0.05
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.06	15	0.5

PC: Periodo de Carenza / LMR: Límite Máximo de Residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar TILLOT®250 EC a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

