

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazol

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni dar nada por la boca si la persona se encuentra inconsciente. Lave la boca con abundante agua.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón al menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Si la respiración se dificulta, proporcionar respiración artificial.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua por lo menos durante 15 a 20 minutos. Remover lentes de contacto, si es posible. Buscar atención médica.

Nota al médico: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**Teléfonos de emergencia
EsSalud: 411-8000 (opción 4)**



Composición:..... 250 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 977-SENASA

Titular de Registro:



Formulado por:
ASCOT INTERNATIONAL (1996) LTD.
Ascot House Welcroft Street Stockport,
Cheshire SK1 1DF UK, United Kingdom

Contenido Neto: 500 mL

N° de lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Importado y Distribuido por:
QSI PERU S.A.
Av. República de Panamá 2577,
La Victoria Lima-Perú
Tel.: 710-4000

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TILLOT[®]250 EC es un fungicida de amplio espectro que pertenece al grupo de los triazoles, de acción sistémica y buen poder residual.

TILLOT[®]250 EC es eficaz en el control preventivo y curativo.

TILLOT[®]250 EC se aplica por aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas, previa calibración del equipo. Llenar el tanque del equipo de aplicación a la mitad; preparar una pre-mezcla aparte e incorporarla al tanque de aplicación. Luego adicionar agua hasta completar el volumen requerido. Durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto mantener en marcha el sistema de agitación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS (L/ ctt 200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Quemado del arroz	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.15	36	7.0
Espárrago	Roya del espárrago	<i>Puccinia asparagi</i>	0.1	30	0.05
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.06	15	0.3

PC: Período de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar TILLOT[®]250 EC a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

