

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, no fumar ni beber durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar bajo llave en lugares frescos, secos y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazoles

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito ni dar nada por la boca si la persona se encuentra inconsciente. Lave la boca con agua abundante. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lave la piel con abundante agua fresca al menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Si la respiración se dificulta, proporcionar respiración artificial. Mantener al afectado recostado y abrigado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua por lo menos durante 15 a 20 minutos. Remover lentes de contacto si es posible. Buscar atención médica.

Nota al Médico: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomáticamente.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800-1-3040

CISPROQUIM: 0800-50847

Aló EsSalud: 472-2300 (emergencias 24 horas)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Tillot 250 EC®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Propiconazole 250 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 977-SENASA

Titular de Registro:



QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL
DEL PERU S.A.



Formulado por:

SHARDA WORLDWIDE EXPORTS Pvt. Ltd.

Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West)

Mumbai 400 050, India.

Importado y Distribuido por:

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.

Av. República de Panamá 2577.

La Victoria. Lima-Perú

Tel.: 710-4000

Contenido Neto: 0.5 L

Lote N°:

Fecha Fab.:

Fecha Venc.:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TILLOT 250 EC es un fungicida de amplio espectro que pertenece al grupo de los triazoles, de acción sistémica y buen poder residual.

TILLOT 250 EC es eficaz en el control preventivo y curativo.

TILLOT 250 EC actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol en las membranas celulares de los hongos, que es un constituyente natural de las paredes celulares, lo que provoca la pérdida de funcionalidad de las mismas.

TILLOT 250 EC es recomendable aplicarlo antes, durante y después del período infeccioso de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma. Se aplica por aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas, previa calibración del equipo. Llenar el tanque del equipo de aplicación a la mitad, preparar una pre-mezcla aparte e incorporarla al tanque de aplicación. Luego adicionar agua hasta completar el volumen requerido. Durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto mantener en marcha el sistema de agitación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS (L/ cil 200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Roya del espárrago	<i>Puccinia asparagi</i>	0.1	30	0.05
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.06	15	0.5

PC: Período de Carenia / LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar TILLOT 250 EC a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma.

PERIODO DE REINGRESO

Después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

TILLOT 250 EC es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina y aguas con pH mayores a 8. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados y a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, no fumar ni beber durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar bajo llave en lugares frescos, secos y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazoles

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito ni dar nada por la boca si la persona se encuentra inconsciente. Lave la boca con agua abundante. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lave la piel con abundante agua fresca al menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Si la respiración se dificulta, proporcionar respiración artificial. Mantener al afectado recostado y abrigado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua por lo menos durante 15 a 20 minutos. Remover lentes de contacto si es posible. Buscar atención médica.

Nota al Médico: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomáticamente.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800-1-3040

CISPROQUIM: 0800-50847

Aló EsSalud: 472-2300 (emergencias 24 horas)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Tillot 250 EC®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Propiconazole 250 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 977-SENASA

Titular de Registro:



QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL
DEL PERU S.A.



Formulado por:

SINOCHEM NINGBO LTD.
21 Jiangxia ST, Ningbo 315000
China

Contenido Neto: 0.5 L

Lote N°:

Fecha Fab.:

Fecha Venc.:

Importado y Distribuido por:

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.
Av. República de Panamá 2577.
La Victoria. Lima-Perú
Telf.: 710-4000

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TILLOT 250 EC es un fungicida de amplio espectro que pertenece al grupo de los triazoles, de acción sistémica y buen poder residual.

TILLOT 250 EC es eficaz en el control preventivo y curativo.

TILLOT 250 EC actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol en las membranas celulares de los hongos, que es un constituyente natural de las paredes celulares, lo que provoca la pérdida de funcionalidad de las mismas.

TILLOT 250 EC es recomendable aplicarlo antes, durante y después del período infeccioso de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma. Se aplica por aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas, previa calibración del equipo. Llenar el tanque del equipo de aplicación a la mitad, preparar una pre-mezcla aparte e incorporarla al tanque de aplicación. Luego adicionar agua hasta completar el volumen requerido. Durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto mantener en marcha el sistema de agitación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS (L/ cil 200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Roya del espárrago	<i>Puccinia asparagi</i>	0.1	30	0.05
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.06	15	0.5

PC: Período de Carenia / LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **TILLOT 250 EC** a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma.

PERIODO DE REINGRESO

Después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

TILLOT 250 EC es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina y aguas con pH mayores a 8. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados y a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

