

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazol

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni dar nada por la boca si la persona se encuentra inconsciente. Lave la boca con abundante agua.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón al menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Si la respiración se dificulta, proporcionar respiración artificial.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua por lo menos durante 15 a 20 minutos. Remover lentes de contacto, si es posible. Buscar atención médica.

NOTA AL MÉDICO: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**Teléfonos de emergencia
EsSalud: 411-8000 (opción 4)**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



Tillot 250 EC[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Propiconazole 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA Nº 977-SENASA

Titular del Registro:



Formulado por:

SHARDA CROPCHEM LIMITED
Domnic holm, 29th Road, Bandra (West)
Mumbai 400050, India.

Importado y Distribuido por:

SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577.
La Victoria, Lima-Perú
Telf.: 710-4000

Contenido Neto: 500 mL

Nº de lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TILLOT[®]250 EC es un fungicida de amplio espectro que pertenece al grupo de los triazoles, de acción sistémica y buen poder residual.

TILLOT[®]250 EC es eficaz en el control preventivo y curativo.

TILLOT[®]250 EC se aplica por aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas, previa calibración del equipo. Llenar el tanque del equipo de aplicación a la mitad; preparar una pre-mezcla aparte e incorporarla al tanque de aplicación. Luego adicionar agua hasta completar el volumen requerido. Durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto mantener en marcha el sistema de agitación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS (L cil 200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Quemado del arroz	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.15	36	7.0
Espárrago	Roya del espárrago	<i>Puccinia asparagi</i>	0.1	30	0.05
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.06	15	0.3

PC: Periodo de Carenia / LMR: Limite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **TILLOT[®]250 EC** a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

