

48 cm

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Triazina.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 13040 o 328-7700
ESSALUD: 0801 10200 o 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



PAKATAN[®] 500FW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Ametryn..... 500 g/L
Inertes.....c.s.p. 1 L

Reg. N° 963 - 2000 - AG-SENASA

Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.



Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 20L

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO.,LTD
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town,
Hangzhou, Zhejiang Province - CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La ametrina ingrediente activo de PAKATAN 500 FW es absorbido por las malezas tanto por la vía foliar como radicular siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/200L		
Caña de Azúcar	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	4.0 - 6.0	-	30	0.25
	Rabo de zorro	<i>Setaria verticillata</i>				
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>				
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				
	Cerraja	<i>Sonchus oleraceus</i>				
Yuyo	<i>Amaranthus spp.</i>					
Piña	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	-	1.5 - 2.0	120	0.05
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Pichana	<i>Sida panicula</i>				

Con el cultivo ya emergido, es preferible que **PAKATAN 500 FW** sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se le emplee en mezcla con humectante (EXTRAVON) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado de desarrollo y/o grado de infestación de las malezas

ND: No determinado PC: Periodo de carencia LMR: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar el producto, agítese bien el envase cerrado, verter la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Aún cuando **PAKATAN 500 FW** ejerce una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcance un desarrollo máximo de 5-10 cm. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con las boquillas adecuadas y sobre todo que se adapte a la modalidad de tratamiento seleccionado. Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 400 L con equipos terrestres y entre 40 y 50 L con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: **PAKATAN 500 FW** es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: **PAKATAN 500 FW** no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



14.5 cm

2.2 cm