

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Usar ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No mezclar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Trietna.
- En caso de intoxicación lleve al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fue con la piel, lávela con abundante agua y jabón.

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 017-8400

- Beber abundante agua estada para inducir el vómito. No lleve antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre en estado inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DERECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de dar de recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.

PAKATAN[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Amesim 500 g/L
Inertes 500 g/L

Reg. N° 863 - 2000 - AG-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor per:
NEO AGRUM S.A.C.

neogrum

Calle Camarinas 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 017-8400 / Fax: 017-8401

Contenido neto: 200 L

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por:

SINOCHEM AGRO CO. LTD.

17-19 th Floor, N° 33 He Nan Road (B), Shanghai 200002

China

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La amesim ingrediente activo de PAKATAN 500 FW es absorbido por las malezas tanto por la vía foliar como radicular siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de Azúcar	Pala de gallina	Echinochloa indica	4.0 - 8.0	30	0.25
	Rato de zorro	Setaria verticillata			
	Cacilo	Cenchrus ciliaris			
	Chamico	Datura stramonium			
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Amor seco	Bidens pilosa			
	Carrizal	Sonchus oleraceus			
	Vuyo	Amaranthus spp.			

Con el cultivo ya emergido, es preferible que PAKATAN 500 FW sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se le emplea en mezcla con humectante (EXTRACTION) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado de desarrollo y/o grado de infestación de las malezas.

N.D. No determinado P.C. Periodo de carencia L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar el producto, agite bien el envase cerrado, verifique la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Aún cuando PAKATAN 500 FW ejerce una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcanza un desarrollo máximo de 5-10 cm. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con las boquillas adecuadas y sobre todo que se adapte a la modalidad de tratamiento seleccionado. Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 400 L con equipos terrestres y entre 40 y 50 L con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERIODO DE REINGRESO: No permitir el reingreso al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: no presenta riesgo de fitotoxicidad al se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, al se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



VERSIÓN 03-HZ
ULTIMA REVISIÓN: 29-11-12

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cambie la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Trietanol.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTEX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 017-6400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre en estado inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación.
- Luego insértelo triturado o perforado y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acople autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrenantes del producto.



PAKATAN[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Analyt..... 500 g/L
Inertes..... 500 g/L

Reg. N° 903 - 2000 - AG-SENASA
Titular del Registro, Importador y Distribuidor por:
NEOAGRUM S.A.C.

neogrump

Calle Cantuarina 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 017-6400 / Fax: 017-6401

Contenido neto: 200 L

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
SHENGUA SEGA
207 West, Fancy Garden N° 6
Xibane South Road, Chaoyang District-Beijing 100028
China

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La emetina ingrediente activo de PAKATAN 500 FW es absorbida por las malezas tanto por la vía foliar como radicular siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de Azúcar	Paja de goma	Echinochloa polystachya	4.0 - 6.0	30	0.25
	Rato de zorro	Setaria verticillata			
	Cadillo	Cenchrus echinatus			
	Chamiso	Digitaria stramonium			
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Amar seco	Bidens pilosa			
	Carrizo	Sonchus oleraceus			
	Vuyo	Amaranthus spp.			

Con el cultivo ya emergido, es preferible que PAKATAN 500 FW sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se emplea en mezcla con humectante (EXTRA-VON) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado de desarrollo y/o grado de infestación de las malezas.

N.D.: No determinado P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar el producto, agítelo bien el envase cerrado, verter la cantidad necesaria según la dosis recomendada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Aún cuando PAKATAN 500 FW es una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcanza un desarrollo máximo de 5-10 cm. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con las boquillas adecuadas y sobre todo que se adapte a la modalidad de tratamiento seleccionado. Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 400 L con equipos terrestres y entre 40 y 50 L con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERÍODO DE REINGRESO: No permitir el reingreso al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.
COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

PHYTOTOXICIDAD: no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



VERSION 03-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 29-11-12

2009

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Origen Químico: Tóxico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lávelos con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 017-6400

- Beber abundante agua azuada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre en estado inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DEBECOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, esteros o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrecitos del producto.



PAKATAN[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Ametrin..... 500 g/L
 Inertes..... 500 g/L

Reg. N° 963 - 2000 - AG-SENASA
 Titular del Registro, Importador y Distribuidor por:
 NEOAGRUM S.A.C.

neagrums
 Calle Centuarías 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
 Teléfono: 017-6400 / Fax: 017-6401

Contenido neto: 200 L

N° de Lote:
 F. de Form.:
 F. de Venic:

Formulado por
 SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD
 8th Floor, Geomphushuangye Centre,
 Shunhua Road 7508, Jinan, Shandong
 CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La sustancia ingrediente activo de PAKATAN 500 FW es absorbida por las malezas tanto por la vía foliar como radicular siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (g/ha)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de Azúcar	Pata de gallo	Elaeagnus indica	4.0 - 6.0	30	0.25
	Rato de zorro	Sesuvium portulacastrum			
	Cedillo	Cenchrus ciliaris			
	Chirico	Datura stramonium			
	Verdolaga	Portulaca oleraceae			
	Amor seco	Bidens pilosa			
	Cenaja	Sonchus oleraceus			
	Yuyo	Amaranthus spp.			

Con el cultivo ya emergido, es preferible que PAKATAN 500 FW sea aplicado en forma dirigida al suelo que cuando se le aplica en mezcla con humectante (EXTRACTION) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado de desarrollo y/o grado de infestación de las malezas.

N.D. No determinado P.C. Periodo de carencia L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar el producto, agítalo bien el envase cerrado, verifique la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego complételo con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Aún cuando PAKATAN 500 FW ejerza una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcanza un desarrollo máximo de 5-10 cm. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con las boquillas adecuadas y sobre todo que se ajuste a la modalidad de tratamiento seleccionado. Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 400 L con equipos terrestres y entre 40 y 60 L con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERIODO DE REINGRESO: No permitir el ingreso al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, sulfato, aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

VERSIÓN 03-HZ
 ÚLTIMA REVISIÓN: 29-11-12

0028

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Tóxicos.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávela con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 9800 - 1 - 3940 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua estada para inducir el vómito. No lleve antidoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre en estado inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DEBECOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acople autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, esteros o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.

PAKATAN®

500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Amesyn 500 g/L
Inertes 500 g/L

Reg. N° 983 - 2000 - AG-SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEO AGRUM S.A.C.

neogrum

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 200 L

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Veric:

Formulado por
MEGHAN INDUSTRIES LTD
Box N° 400, 401 & 455, Vía a Chiracá TA
Sanand Almeda 382170
India

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La ametrina ingrediente activo de PAKATAN 500 FW es absorbida por las malezas tanto por la vía foliar como radicula siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de Azúcar	Pata de gallo	Eleusine indica	4.0 - 6.0	30	0.25
	Rabo de toro	Setaria verticillata			
	Cañillo	Cenchrus echinatus			
	Chanclo	Datura stramonium			
	Verdelaga	Portulaca oleraceae			
	Amor seco	Bidens pilosa			
	Cenaja	Sonchus oleraceus			
	Yuyo	Amaranthus spp.			

Con el cultivo ya emergido, se recomienda que PAKATAN 500 FW sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se le aplica en mezcla con hormonas (EXTRAUCHO) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado de desarrollo y/o grado de infestación de las malezas.

N.D. No determinado P.C. Periodo de carencia L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar el producto, agítelo bien el envase cerrado, verter la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Aún cuando PAKATAN 500 FW ejerce una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcanza un desarrollo máximo de 5-10 cm.

Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con las boquillas adecuadas y sobre todo que se ajuste a la modalidad de tratamiento seleccionado. Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 400 L con equipos terrestres y entre 40 y 50 L con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERIODO DE REINGRESO: No permitir el ingreso al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con cualquier tipo de uso común excepto con caldo Bordeaux, sulfato, sales y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que se ejerce para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

VERSIÓN 03-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 29-11-12

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Usar ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Txicos.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 017-8400

- Beber abundante agua estada para inducir al vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre en estado inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DEBECOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilízalo triturándolo o perforándolo y deposítalo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, esteros o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.



PAKATAN[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Ametrin 500 g/L
Inertes 800 g/L

Reg. N° 963 - 2000 - AG-SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEO AGRUM S.A.C.

neogrump

Calle Centuaras 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 017-8400 / Fax: 017-8401

Contenido neto: 200 L

N° de Lot:
F. de Form:
F. de Venc:

Formulado por:
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD.
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town,
Hangzhou, Zhejiang Province
China

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La ametrina ingrediente activo de PAKATAN 500 FW es absorbida por las malezas tanto por la vía foliar como radicular siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de Azúcar	Papa de galia	Elasmio indica	4.0 - 8.0	30	0.25
	Papa de zorro	Selenia vesiculata			
	Cadillo	Cenchrus echinatus			
	Chamico	Detaria stramonium			
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Amor seco	Ecleria pilosa			
	Cenaja	Sarcocolla olivacea			
	Vuyo	Amaranthus spp.			

Con el cultivo ya emergido, es preferible que PAKATAN 500 FW sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se lo aplica en mezcla con humectante (EXTRAVON) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado de desarrollo y/o grado de infestación de las malezas.

N.D. No determinado P.C. Periodo de carencia L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar el producto, agítelo bien el envase cerrado, verter la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Aún cuando PAKATAN 500 FW sea una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcanzan un desarrollo máximo de 5-10 cm. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con las boquillas adecuadas y sobre todo que se ajuste a la modalidad de tratamiento seleccionado. Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 400 L con equipos temporales y entre 40 y 80 L con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERIODO DE REINGRESO: No permitir el ingreso al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: no presenta riesgo de fitotoxicidad al ser aplicada en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

VERSIÓN 03-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 29-11-12

0030

48 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar el producto conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni fumajes.
- No reventar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Trietoxi.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 8800 - 1 - 3848 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre en estado inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DEBILIDAD Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego infundido filtrándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de accepción autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estuarios o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



PAKATAN[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Ametrin 500 g/L
Inertes 500 g/L

Reg. N° 863 - 2000 - AG-SENASA
Titular del Registro, Importador y Distribuidor por:
NEO AGRUM S.A.C.

neogrum

Calle Centurias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 200 L

N° de Lot:
F. de Form:
F. de Ven:

Formulado por:
DUPOCSA, PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.
84 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou,
Zhejiang Province
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La ametrina ingrediente activo de PAKATAN 500 FW es absorbida por las malezas tanto por la vía foliar como radicular siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de Azúcar	Pila de gallina	Eleusine indica	4.0 - 6.0	30	0.25
	Pila de zorrillo	Setaria verticillata			
	Cañazo	Cenchrus ciliaris			
	Chamico	Datura stramonium			
	Verdolaga	Portulaca oleraceae			
	Amar seco	Sida sp.			
	Carrizo	Amaranthus spp.			

Con el cultivo ya emergido, es prohibible que PAKATAN 500 FW sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se le emplee en mezcla con humectante (EXTRAVON) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado de desarrollo y/o grado de infestación de las malezas.

N.D.: No determinado P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar el producto, agítelo bien al envase cerrado, verifique la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Aún cuando PAKATAN 500 FW ejerce una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcanzan un desarrollo máximo de 5-10 cm. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con las boquillas adecuadas y sobre todo que se ajuste a la modalidad de tratamiento seleccionado. Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 400 L con equipos terrestres y entre 40 y 80 L con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERÍODO DE REINGRESO: No permitir el reingreso al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo bordelés, sulfato, azules y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

VERSIÓN 03-1Z
ULTIMA REVISIÓN: 29-11-12

0031

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupos Químicos: Trietilos.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 017-8400

- Beber abundante agua estada para inducir el vómito. No lleve antidoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre en estado inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilízalo triturándolo o perforándolo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



PAKATAN®

500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Ametyn: 500 g/L
Inertes: 500 g/L

Reg. N° 963 - 2000 - AG-SENASA
Titular del Registro, Importador y Distribuidor por:
NEOAGRUM S.A.C.

neogrums

Calle Carhuarías 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 200 L

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
YANCHENG TAI HE CHEMICALS CO. LTD
Chenjiagang Chemical Park, Jiangshu County
Yancheng, Jiangsu Province - CHINA


NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La emetina ingrediente activo de PAKATAN 500 FW es absorbida por las malezas tanto por la vía foliar como radiclar siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Ceba de Añico	Paja de gailia	Echinochloa indica	4.0 - 6.0	30	0.25
	Rabo de vaca	Setaria verticillata			
	Cañito	Cenchrus echinatus			
	Chamico	Datura stramonium			
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Amar seco	Echinochloa polystachya			
	Cornaje	Sonchus oleraceus			
	Vuyo	Amaranthus spp.			

Con el cultivo ya emergido, es preferible que PAKATAN 500 FW sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se le emplea en mezcla con humectantes (EXTRAVION) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado de desarrollo y/o grado de infestación de las malezas.

N.D. No determinado P.C. Período de carencia LMR. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar el producto, agítelo bien en el envase cerrado, verifique la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Aus cuando PAKATAN 500 FW ejerce una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcanzan un desarrollo máximo de 5-10 cm. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con las boquillas adecuadas y sobre todo que se ajuste a la modalidad de tratamiento seleccionado. Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 400 L con equipos terrestres y entre 40 y 60 L con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERÍODO DE REINGRESO: No permitir el reingreso al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con cido bórico, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para las plagas aquí recomendadas, al se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

VERSIÓN 03-HZ
ULTIMA REVISIÓN: 29-11-12

0932

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Tóxico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTEX: 0505 - 1 - 3048 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua estada para inducir el vómito. No lleve antidoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre en estado inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrenantes del producto.



PAKATAN[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:
 Ametryn..... 500 g/L
 Inertes..... 500 g/L

Reg. N° 993 - 2000 - AG-SENASA
 Titular del Registro, Importador y Distribuidor por:
 NEOAGRUM S.A.C.

neogrump

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
 Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 200 L

N° de Lote:
 F. de Form.:
 F. de Venc.:

Formulado por:
 SINOCHEN NINGBO LTD 21
 Jiangxia St. Ningbo 315000
 China

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La ametrina ingrediente activo de PAKATAN 500 FW es absorbida por las malezas tanto por la vía foliar como radicular siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (g/m ²)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de Arábica	Pata de gallo	Equisetum indica	4.0 - 6.0	30	0.25
	Rabo de zorro	Setaria verticillata			
	Cafillo	Cenchrus echinatus			
	Chamico	Setaria stramonium			
	Veribaga	Portulaca oleracea			
	Amor seco	Bidens pilosa			
	Cereja	Sonchus oleraceus			
	Vuyo	Amaranthus spp.			

Con el cultivo ya emergido, es preferible que PAKATAN 500 FW sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se le emplee en mezcla con humectante (EXTRAVON) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado de desarrollo y/o grado de infestación de las malezas.

N.D. No determinado P.C. Período de carencia L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar el producto, agítelo bien el envase cerrado, verifique la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego complete con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Aún cuando PAKATAN 500 FW ejerce una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcanza un desarrollo máximo de 5-10 cm. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con las boquillas adecuadas y sobre todo que se ajuste a la modalidad de tratamiento seleccionado. Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 300 L con equipos terrestres y entre 40 y 60 L con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERÍODO DE REINGRESO: No permitir el reingreso al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con cido-boréox, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: No presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.