

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación del producto y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenen ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- El producto es irritante para los ojos, deberá de usar gafas de seguridad.
- Utilice respirador o mascarilla durante la aplicación del producto. Evite respirar partículas de aspersión.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**DOBLE CU-AG®**, es un acaricida a base de Abamectin, que tiene acción por contacto e ingestión y tiene movimiento translaminar en las hojas que permiten el control de ácaros.

Para la preparación de la mezcla:

**DOBLE CU-AG®** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva a un cilindro o mochila, según sea el caso y completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aplicación terrestre.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Lactona macrocíclica
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, no aplicar medicina salvo lo indique un médico. Acudir el centro médico más cercano.
- Si el contacto fuese con la piel, lavar el área afectada con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste consultar al médico.
- En caso de ingestión no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral si el paciente está inconsciente. Si el paciente está consciente podrá administrarle agua.
- Acudir al médico.
- En caso de inhalación retire al paciente del área contaminada, hacia un área ventilada. Recibir atención médica.
- En caso de emergencia llamar a:

**CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas) ó  
ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 ó  
CISPROQUIM: 080-050-847**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y depositelo en los sitios por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- 1-Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos, evitar la aplicación en época de floración.
- 2-Tóxico para organismos acuáticos.
- 3-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- 4-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación y sobrantes del producto.
- 5-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- 6-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- 7-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

**CUADRO DE USOS**

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L /200L	L/ha		
Palto	Acaro marrón	<i>Olygonychus punicae</i>	0.15 - 0.2	0.15 - 0.2	14	0.02
	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	0.08 - 0.12	0.24 - 1.2	10	0.01
Mandarina	Minador de las hojas	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.08 - 0.20	0.25 - 1.6	10	0.01
	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	0.12 - 0.18	0.60 - 1.73	10	0.01
Holantao	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.15 - 0.25	0.15 - 0.85	3	0.01
Vid	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.12 - 0.15	0.45 - 1.13	28	0.01

PC: Periodo de carencia en días  
LMR: Limite máximo de residuos en ppm

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

**DOBLE CU-AG®** debe de ser aplicado cuando se observan los primeros daños en las plantas. Se recomienda hacer una aplicación por campaña.

En el cultivo de mandarina para el control de *Phyllocnistis citrella* se recomienda aplicar **DOBLE CU-AG®** a menor dosis (0.08 L/200L) cuando las infestaciones sean bajas y a mayor dosis (0.20 L/200L) cuando las infestaciones sean altas.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**DOBLE CU-AG®** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con aquellos de pH inferior a 4.5

**FITOTOXICIDAD**

No se observan efectos de fitotoxicidad en el cultivo con la dosis y patrón de uso propuesto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

*“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones e indicaciones dadas”*

