“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación del producto y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
-No almacenen ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Después de usar el producto, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
-El producto es irritante para los ojos, deberá de usar gafas de seguridad.
-Utilice respirador o máscara durante la aplicación del producto. Evite respirar partículas de aspersión.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo químico: Lactona macrocíclica.
-Este producto no tiene antídoto especifico. Tratamiento sintomático.
-En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, no aplicar medicina salvo que lo indique un médico. Acudir el centro médico más cercano.
-Si el contacto fuese con la piel, lavar el área afectada con abundante agua y jabón.
-Si la irritación persiste consultar al médico.
-En caso de ingestión no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral si el paciente está inconsciente. Si el paciente está consciente podrá administrarle agua. Acudir al médico.
-En caso de inhalación retire al paciente del área contaminada, hacia un área ventilada. Recibir atención médica.
-En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-1-3040 (Atención las 24 horas) ó
ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 ó CISPROQUIM: 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

-Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos, evitar la aplicación en época de floración.
-Tóxico para organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación y sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

DOBLE CU-AG®

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingrediente Activo:
Abamectin..... 18 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1L

Registro PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

AGRIMORPHO S.A.C
Mz.3, Lt.8, Dpto. 301 - 401, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo - Perú. Teléfono: (044) 28 - 9877, Nextel: 831*5780.
info@agrynova.com, www.agrynova.com

FABRICANTE O FORMULADOR:

HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO., LTD.
393 East Heping Road Shijiazhuang City Hebei Province P.R. China
Telf.: 86-311-85916150 / 85916151

IMPORTADOR:

AGriMorpho S.A.C.
Mz 3 Lt. 8 Jardines del Golf. Trujillo-Peru

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **1 L**
Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES USO Y MANEJO

DOBLE CU-AG® es un acaricida a base de Abamectin, que tiene acción por contacto e ingestión y tiene movimiento translaminar en las hojas que permiten el control de ácaros.

Para la preparación de la mezcla:
DOBLE CU-AG® se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego está solución se lleva a un cilindro o mochila, según sea el caso y completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aplicación terrestre.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L /200L	L/ha		
Palto	Acaro marrón	*Olygonichus punicae*	0.15 - 0.2	0.15 - 0.2	14	0.02
Mandarina	Arañita roja	*Panonychus citri*	0.08 - 0.12	0.24 - 1.2	10	0.01
	Minador de las hoja	*Phyllocnistis citrella*	0.08 - 0.20	0.25 - 1.6	10	0.01
Tangelo	Acaro del tostado	*Phyllocoptruta oleivora*	0.12 - 0.18	0.60 - 1.73	10	0.01
Holantao	Mosca minadora	*Liriomyza huidobrensis*	0.15 - 0.25	0.15 - 0.85	3	0.01
Vid	Arañita roja	*Tetranychus urticae*	0.12 - 0.15	0.45 - 1.13	28	0.01

PC: Periodo de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOBLE CU-AG® debe de ser aplicado cuando se observan los primeros daños en las plantas. Se recomienda hacer una aplicación por campaña.

En el cultivo de mandarina para el control de *Phyllocnistis citrella* se recomienda aplicar **DOBLE CU-AG®** a menor dosis (0.08 L/200L) cuando las infestaciones sean bajas y a mayor dosis (0.20 L/200L) cuando las infestaciones sean altas.

PERIODO DE REINGRESO

No reingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

DOBLE CU-AG® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con aquellos de pH inferior a 4.5

FITOTOXICIDAD

No se observan efectos de fitotoxicidad en el cultivo con la dosis y patrón de uso propuesto.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones e indicaciones dadas”