

32.0 cm

1.0 cm

0.8 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: TRIAZINAS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un lugar con aire fresco, si existe respiración con dificultad, practicar respiración artificial.
- No dar de beber nada ni induzca al vómito a un paciente que se encuentre inconsciente

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040

BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002

Antídoto: No existe antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



ATRAPLUS 500 SC

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Atrazina 500 g/l
Aditivos c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 980 - SENASA

Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING S.A.C.

Importado y distribuido por:

BIOAGROCORP TRADING S.A.C.



Calle Los Flamencos N° 121 Interior 6 Santa Anita - Lima 43

Teléfono: 478-2001 Fax: 362-0014

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por:

HONBOR INDUSTRIAL CO., LTD

30/F, Golden Center Tower N° 3037

Jintian Road CBD Futian, Shenzhen

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Contenido neto: 4 L

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ATRAPLUS 500 SC es un herbicida sistémico selectivo post-emergente utilizado para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en el cultivo de maíz.

Aplicar **ATRAPLUS 500 SC** mediante pulverizaciones con cualquier equipo de aspersión terrestre, para lo cual se debe agregar al tanque de aspersión agua hasta la mitad y luego la dosis recomendada del producto, agitándolo continuamente con el volumen completo de agua, hasta que el producto este bien disuelto

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS L /Ha	P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Maíz	"Verdolaga" "Yuyo" "Amor seco" "Lechera"	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Euphorbia pepus</i>	1.5	7	0.1

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límites máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar **ATRAPLUS 500 SC** desde la emergencia hasta que el maíz tenga 20-25 cm de altura. Realizar una sola aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

FITOTOXICIDAD: ATRAPLUS 500 SC no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

COMPATIBILIDAD: ATRAPLUS 500 SC es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



2.2 cm